



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

“DERMATITIS ATÓPICA”

Brian Martin Morales López

INMUNOALERGIAS

Semestre: 8°

Grupo: “B”

Dra. Lía Gabriela Luna Villanueva

Comitán de Domínguez; Chiapas, a 26 de Marzo del 2021.

DERMATITIS ATÓPICA



Dermatitis Atópica

La Dermatitis Atópica (DA) ó eccema atópico es una enfermedad de la piel caracterizada por manifestaciones de inflamación crónica: prurigo intenso, piel seca, eritema y exudado.

Prevalencia:

- Países desarrollados entre el 15-30% de los niños sufren la enfermedad.
- 60% son diagnosticados antes del año de edad, y en torno al 85% debutan antes de los 5 años de vida.

Factores de riesgo:

- Genético.
- Irritantes, jabones detergentes, shampoo, gel, jabones líquidos.
- Infecciones de la piel.
- Contacto con: inhalación de alérgenos, y alimentos potencialmente alérgicos.

Fisiopatología:

- La DA es una enfermedad compleja y multifactorial.
- Se ha implicado a la hipersensibilidad mediada por Th2 e IgE y por la respuesta Th1 como respuesta autoinmune.

Cuadro clínico:

- Piel muy seca y con prur intenso.
- Piel inflamada y roja.
- Pequeños bultos en la piel.
- Piel engrosada.
- Excoriaciones.

Diagnóstico:

- Historia clínica.
- La DA debe ser diagnosticada cuando el niño presenta piel seca con prurito, más 3 de los siguientes criterios:

Tratamiento:

- Iniciar y mantener los emolientes como la base del manejo de la DA en niños, indicar para uso diario: lubricación y asoc.
- Corticosteroides tópicos.
 - Potencia leve:
 - Hidrocortisona tópica al 2.5% 1-2 veces al día por 5-7 días sin sobrepasar 2 semanas y continuar con emolientes.
 - Moderada potencia
 - Fluocinolona tópica 2 veces al día por 7 días y continuar con emolientes.
- En caso de prurito intenso:
 - Loratadina V.O. 5mg/día en <30kg.
 - Loratadina V.O. 10mg/día en >30kg.

- Dermatitis en área de flexión.
- Dermatitis visible en mejillas.
- Historia personal de dermatitis.
- Historia personal de piel seca durante los últimos 12 meses.
- Historia personal de asma o rinitis alérgica o historia de enfermedad atópica en familiares de primer grado en niños <4 años.
- Inicio de signos y síntomas en niños menores de 2 años (este criterio no debe ser utilizado en niños <4 años).