

Cuadro Clínico

- Diagnóstico
- Clínico
- Prueba cutánea
- Citoloxia nasal
- BH
- SPN y Tórix

- Obstrucción nasal
- Otorrhea grande
- Piorrea nasal y faringeo
- Estornudos
- Moco nasal
- Ojeras
- Líneas de Dennis
- Susto nasal
- Alineación nasal
- Rinorrea hidráulica

Estadísticas

- Afecta al 10-15% de la población mundial
- Adolescentes y adultos jóvenes

Tratamiento.

Antihistamínicos

- Clorfenamina
- Cloropiramina
- Difenidramina

- Epinastina
- Fexofenadina
- Loratadina

zida
generación

Tisiopatología.

Definición
Enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal mediada por anticuerpo IgE

Initis Allergica

Factores de riesgo

- Apariación de una respuesta inmunitaria tiente a los alérgenos, medida por IgE específica
- Fase de sensibilidad exposición del antígeno a células presentadoras de antígeno, los linfocitos CD4 segregan la citocina Th2 (IL-4, IL-2, IL-3) estas se une a receptores de linfocitos B y T estimulado un isomero determinado de linfocito B que sintetiza IgE específicas

- La IgE se une sobre receptor de los mastocitos
- Fase clínica: síntomas como respuesta aparente a las exacciones o desintoxicaciones

Fase clínica: síntomas como respuesta aparente a las exacciones o desintoxicaciones