

# Alergia

1 RESCATE  
Anti-histamínicos, broncodilatadores,  
corticoides, adrenalina.  
(DEPENDERÁ DE CADA CASO)

2 TRATAMIENTO  
1 Evitación  
2 Evitación en  
pacientes sensibilizados  
sin síntomas.  
3 Inmunoterapia en  
pacientes graves.

SEGUIMIENTO  
1 Evaluar prótesis  
de evitación  
2 Evitar crisis  
3 Tratamiento de  
rescate  
4 Cumplimiento  
de protocolos.

INDICACION  
Reacción del sistema inmune  
al látex o ciertas proteínas  
que se encuentran en el,  
producto que se fabrica con  
líquidos del árbol de caucho.

DIAGNÓSTICO  
Dick test  
EXTRACTO COMERCIAL DE LÁTEX

Pick - Dick test  
LANCETA PUNCHADA con suero

IgE sérica específica  
Tipo I  
Angioedema  
Asma  
Rinocoriza  
Tipo IV  
Dermatitis de  
contacto.

Test de uso  
Probación  
bronquial

Alimentos con reactividad  
cruzada.  
Anafilaxia

CUADRO CLÍNICO  
Síntomas cutáneos  
Respiratorios  
Dermatitis por  
contacto.

FISIOPATOLOGÍA

PREVALENCIA

18%  
Salas quirúrgicas 7.8%  
Sala médica 8.2%  
Odontólogos 14.3%  
Enfermeras 11.0%

Proteína

Immunológica →  
No inmunológica →  
Productos químicos  
meté todos con proteína.  
IV  
Hipersensibilidad