



UNIVERSIDAD DEL SURESTE "UDS"

HEMATOMAS

DOCENTE: DR. SAMUEL ESAÚ FONSECA FIERRO

ALUMNO: ESTEPHANIA A. FLORES COURTOIS

IMAGENOLOGÍA

CUARTO SEMESTRE

| CARACTERÍSTICAS | HEMATOMA EPIDURAL | HEMATOMA SUBDURAL | HEMATOMA SUBARACNOIDEO "ANEURISMÁTICA" |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Frecuencia | Poco común | Común | Común |
| Etiología u origen | Sangrado por trauma de bajo impacto | Hemorragia por traumatismo de alta energía y fractura de cráneo | Ruptura de aneurisma, traumatismo y malformaciones vasculares |
| Producción de convulsiones | Menor a 25% | 75% | 25% |
| Frecuencia de complicaciones | Frecuencia baja | Frecuencia alta | Frecuencia muy alta |
| Mortalidad | 25% | Menor de 25% | 90-100% |
| Tipo de lesión vascular o fuente de hemorragia | Arterial | Venoso | Arterial- venoso |
| Edad | Presente en la infancia o juventud, común en niños menores de 2 años | Frecuente a partir de los 70 años antes de esa edad causada por traumatismos | Cualquier edad "frecuencia 40 a 65 años" |
| Forma | Biconvexa o lenticular | Cóncava o semilunar | ----- |
| Glasgow presente | Menor a 8 | Menor a 9 | 7-12 |
| Localización | Entre el cráneo y duramadre | Entre la duramadre y la aracnoides | Espacio subaracnoideo |