

CASOS CLINICOS.

1. Se trata de paciente femenino de 19 años de edad que sufre accidente automovilístico de gran impacto, fue asistida por unidad de urgencias que es trasladada a una unidad de urgencias, es valorada por medico en turno, teniendo apertura ocular al estímulo doloroso, sin decir palabras, extensión de extremidades, con herida en cráneo sangrante.

a. ¿Qué medida terapéutica haría en primera instancia?

Valoración de la vía aérea y monitoreo de signos vitales.

b. ¿Qué grado de traumatismo es?

Grado 3 en clasificación de Le Fort, Disyunción craneofacial.

c. ¿Cuál es la puntuación de escala de Glasgow?

5 puntos

d. Que estudio de imagen solicitaría:

Tomografía computarizada con contraste y Radiografía.

2. Paciente masculino de 45 años de edad que acude a urgencias en estado etílico presentando caída desde su propia altura presentado contusión en cráneo, a urgencias presenta desorientación, con irritación además de intranquilidad:

a. ¿Qué diagnostico sospecha?

Traumatismo cráneo encefálico leve

b. ¿Cuál es la puntuación de escala de Glasgow?

14 puntos

c. ¿Qué estudio de imagen solicitaría?

Por el estado en que se encuentra el paciente es necesario realizar una radiografía para verificar y descartar la gravedad de la contusión.

d. ¿Qué tratamiento haría?

Dejar en observación al paciente con aplicación de solución salina hasta que el paciente tenga una mejor respuesta al estado etílico.

3. Se trata de paciente masculino de 56 años de edad que sufre accidente en motocicleta, presentando herida en cráneo, con epistaxis presente y hematemesis con dolor intenso en cara, presenta signo de ojos de mapache:

a. ¿Qué diagnostico sospecha?

Traumatismo craneoencefálico severo, fractura de piso anterior.

b. ¿Qué estudio de imagen solicitaría?

Tomografía computarizada con contraste para mejor visualización.

c. ¿Qué clasificación sería?

Grado 3 en clasificación de Le Fort

d. ¿Por qué pondría esa clasificación?

Disyunción craneofacial en fractura de macizo facial.

4. Se trata de preescolar de 6 años de edad que acude a valoración al área de urgencias que sufre caída al estar jugando con sus primos teniendo contusión en cráneo con herida en nariz, paciente que se encuentra llorando incontrolable, con edema periorbitario.

a. ¿Qué diagnóstico sospecha?

Traumatismo craneoencefálico leve, fractura de hueso nasal

b. ¿Qué puntuación de Glasgow es?

15 puntos

c. ¿Qué tratamiento realizaría?

Radiografía de senos paranasales, con indicación de medicamentos antiinflamatorios, solicitar con especialidad de traumatología pediátrica.