



UNIVERSIDAD DEL SURESTE.

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA.

2DO. SEMESTRE.

2DA. UNIDAD.

MATERIA:

MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA.

DOCENTE:

DR. FONSECA FIERRO SAMUEL ESAU.

ALUMNO:

HERNANDEZ URBINA ANTONIO RAMON.

FECHA:

VIERNES, 23 DE ABRIL DE 2021.

ESTADIOS DE LA SIFILIS.

PRIMARIA:

Atraviesa la mucosa y se dispersa por la vía sanguínea.

10 a 90 días lesión primaria, el chancro es

Este periodo es de alta infecciosidad.

Asiente en genitales o el ano, en la boca también puede haber afectación.

SECUNDARIA:

Aparecen lesiones cutáneas y mucosas.

Muy contagioso, contiene gran cantidad de espiroquetas.

De 4 a 8 semanas la enfermedad se mantiene latente durante un año.

Puede reactivarse.

Existe alta probabilidad de contagio.

TERCIARIA O TARDIA:

Este estadio se manifiesta entre los 5 y 40 años después de su aparición del chancro.

Afecta al SNC.

Pueden presentarse lesiones cutáneas (goma).

CONGENITA:

Se contrae de forma vertical a través de la placenta.

Pueden manifestarse alteraciones en pies, manos y dientes.