

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS

MATERIA: TERAPIA FARMACOLÓGICA

**DOCENTE: DR LUSVIN IRVIN JUÁREZ
GUTIÉRREZ**

ALUMNO: MARCOS GONZÁLEZ MORENO


SEMESTRE Y GRUPO: 4°A

TEMA:

“EFECTOS DE LA MORFINA”

MORFINA

La morfina es un narcótico opiáceo que se utiliza como potente analgésico



Utilización

se usa mucho en medicina para paliar dolores agudos intensos como los que aparecen después de una operación quirúrgica o un infarto agudo de miocardio, aunque también se utiliza para aliviar dolores crónicos tan devastadores como los del cáncer, entre otros.

Realmente la morfina puede ser una gran opción para los pacientes con dolor; sin embargo, cuando se utiliza con fines recreativos o en dosis inadecuadamente altas, la morfina puede generar una fuerte dependencia y graves efectos secundarios.

Efectos a corto plazo

Los principales efectos de la morfina son la euforia, una sensación de intensa relajación y disminución de la percepción del dolor. La morfina está disponible de numerosas formas, como pastillas, inyectables, parches e incluso en supositorios

SIGNOS DE SOBRE DOSIS:
Vómito incontrolado. Dificultad respiratoria / paro respiratorio.
Bradicardia (ritmo cardíaco lento) / paro cardíaco.
Convulsiones. Pérdida de consciencia. En estos casos, es muy importante buscar ayuda de inmediato, ya que una sobredosis de opiáceos puede conducir a coma o la muerte

Dependencia: A medida que genera tolerancia a la droga, la persona tendrá que tomar más y más morfina para obtener los mismos resultados, arriesgando su salud con posibles enfermedades respiratorias e incluso un posible paro cardíaco, así como un aumentando de la probabilidad dañar toda una serie de sistemas de órganos vitales.

Sintomas de abstinencia

Cuando una persona entra en el círculo vicioso de una adicción, es tremendamente difícil salir de ella, ya que los síntomas de abstinencia suelen ser tremendamente desagradables, y la morfina no es ninguna excepción.

Los principales síntomas de abstinencia de la morfina incluyen: Ansiedad. Irritabilidad
Transpiración. Excesiva mucosidad en la nariz. Diarrea. Disminución del apetito. Calambres. Vómitos.

La abstinencia a los opiáceos no suele ser peligrosa para la vida, pero muchos tienen grandes dificultades para llevar a cabo este proceso por su cuenta, ya que la experiencia puede ser bastante desagradable y viene acompañada de fuertes impulsos seguir consumiendo la droga.