



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

ESTENOSIS PILÓRICA

MATERIA: PEDIATRÍA

ALUMNA: DANIA ESCOBEDO CASTILLO

CARRERA: MEDICINA HUMANA

SEMESTRE: SEXTO GRUPO A

ESTENOSIS PILORICA

Es la causa más común de obstrucción del tracto de salida gástrico. Esta patología se considera una de las emergencias de abdomen agudo de la población pediátrica que comúnmente se presenta. Causa más común de obstrucción abdominal en infantes.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

- Vómitos en "proyector", no biliosos, no sanguinolentos inicialmente de carácter intermitente.
- Depresión de la fontanela anterior, disminución del turgor de la piel, membranas mucosas secas, llanto sin lágrimas, retardo en llenado capilar, disminución de la cantidad de orina → ~~DESIDRATACIÓN~~

DIAGNÓSTICO

- Historia clínica
- Examen físico → MASA OLIVAR CUADRANTE SUP
- Prueba de alimentación ^{DEL}
- Alcalosis metabólica hipocloremia hipokalemia
- Contraste → Prueba doble NZI.

MANEJO

- Corregir desbalances hidroelectrolíticos
- Píloromiotomía → Lap.

BIBLIOGRAFÍA

Vargas, J.I. (2016). Diagnóstico de la estenosis pilórica. Revista médica de Costa Rica y Centro América