



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Resumen de TTRN

Docente: Dr. Jeffery Anzhony Cruz Robles

Materia: Pediatría

Alumno: Lara Vega Ismael

Semestre Grupo A

14/abril/2021

Taquipnea transitoria del RN 14/5/21

Se trata de un trastorno del patrón respiratorio que es benigno y autolimitado, con causa por un retraso en la adaptación pulmonar a la vida extrauterina, secundaria a la eliminación del líquido pulmonar fetal, que es tardía. Afecta con frecuencia a primogénitos, a niños de madres jóvenes y a niños prematuros. El cuadro clínico se manifiesta como dificultad respiratoria que se inicia al nacimiento de forma inmediata o a las 2 horas, que tiene predominio de taquipnea (100-120 rpm). El diagnóstico es clínico en función de la historia y los factores de riesgo perinatales. Una radiografía de tórax muestra hipoinflación de costillas y diafragma, e hiperinflatión de segmentos de dificultad respiratoria y la sepsis puede tener manifestaciones similares, de manera que suelen efectuarse radiografías de tórax y hemocultivos y hemocultivos.

El tratamiento es sintomático y consiste en administrar oxígeno y control de gases. Con frecuencia, los RN con ITAN pueden requerir de presión positiva continua en la vía aérea. Debido a las dificultades iniciales para la tolerancia enteral suele administrarse nutrición parenteral.

Bibliografía

Lattari Balest, A. (Octubre de 2019). *Taquipnea transitoria del recién nacido*. Obtenido de Manual MSD: <https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/pediatr%C3%ADa/problemas-respiratorios-en-reci%C3%A9n-nacidos/taquipnea-transitoria-del-reci%C3%A9n-nacido>

Royo Pérez, D., Curto Simón, B., Fernández Espuelas, C., & Pinillos Pisón, R. (2015). Taquipnea transitoria del recién nacido: principales factores de riesgo, evolución y complicaciones. *Boletín de la Sociedad de Peidatría de Aragón, La Roja y Soria*, 69-74.