



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Fimosis y circuncisión

Materia: Pediatría

Presenta: Jesús Alejandro Morales Pérez

6 A

Medicina Humana

Fimosis y Circuncisión.

► Fimosis.

Es una estrechez de la piel que rodea el glande dificultando la visualización del prepucio.
Se divide en 2, fisiológica y patológica.

Fisiológica.

- Se presenta en la mayoría de RN.
- Se presenta entre los 8-11 años, debido al proceso de cicatrización del prepucio.
- 90% se resuelven < 3 años

► Patológica.

- Etiología más frecuente = balanitis xerótica obliterante
- Incidencia en 8-11 años.
- Compromete 32% del glande

► Clasificación.

- Tipo I = Pontiforme sin retracción posible
- Tipo II = Pontiforme, solo exposición del meato ~~uretral~~
- Tipo III = Exposición de la mitad del glande
- Tipo IV = Exposición del glande por encima del surco coronario
- Tipo V = Fácil exposición del glande.

¿Clínicas?

Fimosis Patológica.

Dolor

Hematuria

Globo prepucial

irritación en glande o prepucio.

Balanitis recurrente

Dura

Erecciones dolorosas

Complicaciones.

- Infecciones urinarias recurrentes.
- Balanitis o balanopostitis
- Parafimosis
- Balanitis xerótica obliterante

Diagnóstico.

- Es clínico, no son necesarias las pruebas de imagen.

Tratamiento.

1. Circuncisión (profiláctica / terapéutica)
2. Aplicación de ungüentos con pomadas de corticoides.

Circuncisión

Procedimiento habitual en el que se extrae quirúrgicamente la piel que recubre la punta del pene.

- Las complicaciones más frecuentes son sangrado e infección.

Ocurren en el 2%.

Bibliografía.

Manual MSD Fimosis y circuncisión.