



Universidad del Sureste Escuela
de Medicina

ENTEROCOLITIS NECROSANTE

Docente: Anzhony Cruz Jeffery

Materia: Pediatría

Alumno: Gómez Albores Roberto

Semestre: 6° Grupo A

04/mayo/2021

Enterocolitis Necrosante

Enfermedad adquirida que afecta sobre todo en recién nacidos pretérmino o enfermos, caracterizada por necrosis de la mucosa e incluso de capas más profundas del intestino.

Es la causa más frecuente de enfermedad gastrointestinal adquirida y emergencia quirúrgica del neonato


Factores de riesgo:

- Neonato pretérmino: (RCIU), inmadurez intestinal, disbiosis, sepsis y hipoxemia
- Neonato a término enfermo: hipoxia, isquemia, asfexia, enfermedad cardíaca congénita, hipotensión y sepsis

Patogenia:

La ECN es una enfermedad inflamatoria severa del intestino que afecta comúnmente al íleo y colon.

Su patogenia es multibacterial



Cuadro Clínico:

Se observa predominantemente en prematuros menores de 82 Semanas y/o
Con peso menor de 1500 g

- Inestabilidad térmica
- Aumento de excreciones gastrointestinales
- Letargia
- Vómito bilioso
- Apnea
- Sangre visible u oculta en heces
- Bradicardias
- Distensión abdominal

Diagnósticos:

Los signos típicos de ETO clásica en el postparto ocurren en la segunda
semana de vida e incluyen datos de:

- Inestabilidad alimentaria
- Distensión abdominal
- Sangre en heces
- Signos sistémicos
- Hallazgos en radiografía de abdomen

Tratamiento:

- Estadio I: Se sugiere breve interrupción de la alimentación enteral

- Monitoreo radiológico abdominal
- BIC
- Antitéticos

• Estadio II:

- Suspensión alimentaria enteral por 9-12 días
- monitoreo radiológico por 7-10 días
- Sonda nasogástrica
- Combinación de 2/3 medicamentos antitéticos

• Manejo Quirúrgico

- Manejo Nutricional

Referencias

Gasque-Góngora, J. J. (julio de 2015). *Revisión y actualización de enterocolitis necrosante*. Obtenido de Revista Mexicana de PEDIATRIA :
<https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2015/sp155f.pdf>