



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Infecciones del recién nacido

Materia: Pediatría

Presenta: Jesús Alejandro Morales Pérez

6 A

Medicina Humana

infecciones del Recién nacido.

La infección neonatal puede ser adquirida en el útero por vía transplacentaria o por medio de rotura de membranas; En el canal de parto (durante el parto) y a partir de fuentes externas después del parto.

→ Los agentes virales más frecuentes son los virus del herpes simple, VIH, CTM y HB.

La infección intraparto por VIH o HB se produce por el paso en el canal de parto que está infectado o por infección ascendente si el parto se retrasa tras la rotura de membranas.

→ Los agentes bacterianos son los estreptococos del grupo B, los microorganismos entéricos gram (-) (fundamentalmente *E. coli*), *Listeria monocitogenes*, clamidias, etc.

o infecciones durante el parto.

Las infecciones neonatales por VIH, HIV, HB, estreptococos del grupo B, microorganismos Gram (-), etc suelen transmitirse a través del pasaje por un canal de parto infectado. A veces, puede ocurrir una infección ascendente.

o infecciones posparto.

Se contagiar por contacto con la madre infectada directamente o a través de la lactancia o por contacto con familiares, visitantes, profesionales de la salud, etc.

o Factores de riesgo.

• Edad gestacional.

• Alteraciones del trabajo de parto.

• RN inmunos

• Factores maternos (edad materna).

• Afecciones obstétricas.

Bibliografía = Manual MSD (Generalidades sobre las infecciones neonatales).

Signos y síntomas.

- En los RN los signos y síntomas de infección tienden a ser inespecíficos. Por ejemplo.
 - > Vómitos o mala alimentación
 - > Somnolencia o letargo
 - > Fiebre
 - > Hipotermia
 - > Taquipnea
 - > Exantemas
 - > Diarrea
 - > Distensión abdominal

→ Diagnóstico.

- > Por evaluación clínica.

Hay que considerar una amplia variedad de infecciones, incluida un cuadro de sepsis, en RN enfermos, en el momento del nacimiento o poco después.

Hay que investigar infecciones congénitas, como la Rubéola, sífilis, toxoplasmosis y el CMV.

- > Hemocultivo.

→ Tratamiento

- > Tratamiento antibiótico empírico.

- El tratamiento fundamental para una presunta infección bacteriana en el recién nacido es la terapia AB empírica con fármacos como: Ampicilina - Gentamicina / o ampicilina - cefotaxima. Ya que estos suelen tener efecto en bacterias Gram (+) y Gram (-).