



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

“Resumen de trombosis de la vena renal”

Materia:

Pediatría.

Docente:

Dr. Jeffery Anzhony Cruz Robles

Alumno:

Oscar Miguel Sánchez Argüello

Semestre:

6° “A”

Trombosis de la vena renal

Fenómeno tromboembólico más frecuente del periodo neonatal y lesión vascular del riñón en el RN.

Incidencia global 5 por cada 100.000

Clinica:

- Masa palpable en flanco
- Hematuria
- Proteinuria
- Tromboleptosis
- Falla renal
- HTA

Triada =

- Masa palpable
- Hematuria
- Falla renal

Si el daño llega a uno o más (50%):

- Edema
- Hipotermia
- Cianosis de miembros inferiores

Se presenta durante el primer mes de vida, 3 primeros días (67% de los casos)

Factores de riesgo:

- Asfixia
- Deshidratación
- Acidosis
- HTA
- Policitemia
- Diabetes Materna

Diagnóstico:

- Ecografía doppler: Pérdida de la diferenciación corticomedular renal.
- Doppler color = Ausencia del flujo renal.

Tratamiento:

- Anticoagulantes
- Aspirina no tracciada o de bajo peso molecular
- Fibrinoliticos
- Tratamiento de soporte

Secuelas

- Insuficiencia renal
- Disfuncion renal
- Hipertension Arterial