



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

ESTENOSIS PILORICA

Materia: Pediatría

Presenta: Jesús Alejandro Morales Pérez

6 A

Medicina Humana

Estenosis Pilórica

Es una patología quirúrgica común en la edad pediátrica. A pesar de ser una condición frecuente, su etiología aún no está claramente deducida.

→ Se presenta clínicamente como un síndrome pilórico, producto de una obstrucción al flujo de salida del estómago.

- En su comienzo se puede confundir con un reflujos gastroesofágico fisiológico, pero luego evoluciona a vómitos explosivos hasta en el 70% de los casos.

Posteriormente secundario al ayuno y los vómitos, se puede presentar deshidratación de grado variable que depende ~~de la intensidad~~ de más de la intensidad del cuadro que de la duración de este.

- Entre los signos tardíos se encuentran hematemesis por gastritis secundaria o desgarramiento de la mucosa, constipación por insuficiente ingesta de líquido y leche, deshidratación severa, baja ganancia de peso, ictericia

→ Diagnóstico

- Es clínico

◦ Presencia de:

Vómitos explosivos

Peristaltismo gástrico ~~variable~~ variable

Oliva pilórica palpable

- ECO
- Endoscopia dirigida
- Citometría
- BH

Tratamiento.

- inicial

El tratamiento actual es cirugía, la cual debe realizarse una vez corregidas las alteraciones hidroeléctricas y ácido-base del paciente.

• Por lo que a la sospecha se debe derivar a urgencias.

→ La estabilización puede demorar unas 48-72 hrs., por lo que se debe iniciar un régimen cero y colocar una sonda nasogástrica para desconprimir al estómago.

Bibliografía:

Revista pediátrica electrónica: Revisión de estenosis hipertrófica del píloro.