



UNIDAD II  
PEDIATRÍA

RESUMEN

Alumno: ADRIANA LIZZEHT SANCHEZ MORALES

DR. ANZHONY ROBLES

MEDICINA HUMANA

SEXTO SEMESTRE "A"

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS,

27 DE ABRIL DEL 2021

## Infecciones del RN

27-04-2021

Los RN son muy susceptibles a ciertas enfermedades en mucha mayor medida que los niños mayores o los adultos, encontramos posibles signos de infección:

- Falta de apetito
- Fiebre
- Irritabilidad
- Disnea
- Erupciones cutáneas o cambio en el color de la piel.
- Rigidez

### Enfermedad por estreptococos del grupo B

Son un grupo de bacterias bastante frecuente

que pueden provocar diversas infecciones en RN.

El RN suele adquirir la enfermedad por medio de la madre durante el parto.

Fact. Riesgo: Maternas y del RN como infecciones instaladas o bien transmitidas en el parto de manera directa por la madre.

### Sifilis

Infección congénita de evolución crónica latente

causada por el agente *Treponema pallidum* y es una infección de transmisión sexual, se puede adquirir en el momento del nacimiento.

Se transmite adquirida un mal CP, Tx incompleto y promiscuidad sexual.

Evitar contacto con secreciones vaginales.

Tx → Penicilina benzatínica M 2.4 millones.

### Toxoplasmosis

Infección producida por *Toxoplasma gondii*

CC → Corio retinitis, hidrocefalia, retraso mental. La infección primaria en la madre es un req. para infección fetal y sanguínea.

Parasitemia materna  $\rightarrow$  Ag. causal hacia la placenta donde produce focos de infección.  
La expresión clínica puede darse en meses o años post al nacimiento.

Dx  $\rightarrow$  Estudio de Anticuerpos específicos.

El Tx en la mujer embarazada disminuye el riesgo de transm. transplacentaria

Tx  $\rightarrow$  Pirimetamina 1 mg/kg/día, Sulfadiazol 75-100 mg/kg/día en 2 dosis VO o Sulfametoxazol 30 mg/kg/día en vía oral x día

### Rubeola

Enf. infecciosa viral, causada por parvovirus de la familia Togatoviridae del género Rubivirus

Su transmisión depende de la edad gestacional. La infección en la sem 8/12 de emb origina daño orgánico múltiple

En la sem 16 es más común una lesión a un órgano determinado, sobre todo al canal auditivo.

Forma encefalítica  $\rightarrow$  Afección SNC  
Forma visceral generalizada

Trombocitopenia grave, petequias, equimosis, hepatomegalia, ictericia, neumonitis, miocarditis

### Citomegalovirus

Es un género de herpes virus de la familia Beta, puede causar infección generalizada o focalizada.