



# **UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

## **PEDIATRÍA**

### **RESUMEN**

**Dr. ANZHONY ROBLES**

**Presenta:**

- **Alondra Casaux García**

# Estenosis Pílorica

La estenosis hipertrofica del píloro (EHP) es una patología quirúrgica común en la edad pediátrica. A pesar de su condición frecuente, su etiología no está claramente dilucidada.

En esta patología, la porción pilórica del estómago se encuentra anormalmente gruesa, resultando un engrosamiento y elongación del canal pilórico. Este fenómeno se produce después del nacimiento generando una obstrucción gástrica que produce una dilatación, hipertrofia e hiperperistalsis compensatoria del estómago.

El cuadro clínico se presenta de forma repentina vómitos postprandiales no biliosos, inicialmente el lactante se encuentra hambriento, manifiesta irritabilidad, inquietud y llanto intenso luego del vomito. En un comienzo se puede confundir con el reflujo gastroesofágico fisiológico.

Romero Morgado, G. (2019). Revisión de Estenosis Hipertrófica del Píloro. Revista Pediatría Electrónica, 13(3), 1–6.

[http://www.revistapediatria.cl/volumenes/2016/vol13num3/pdf/ESTENOSIS\\_PILORO.pdf](http://www.revistapediatria.cl/volumenes/2016/vol13num3/pdf/ESTENOSIS_PILORO.pdf)