

"Taquipnea Transitoria del Recien Nacido".

La TTRN es una enfermedad no infecciosa, que ocurre generalmente en el niño pretermino < 37 SDG o cercanos a terminos, o nacidos por cesárea.

Se caracteriza por una frecuencia respiratoria > 60 rpm y dificultad respiratoria después de las primeras 6 hrs de vida. Se debe a la retención de líquido pulmonar con atrapamiento secundario de aire.

Habitualmente la eliminación del líquido pulmonar requiere hasta de 6hrs, sin embargo, se puede obstaculizar lo que incrementa el grosor de la membrana alveolo-capilar y propicia la TTRN.

FACTORES OBSTETRICOS:

* Nacimiento x operación cesárea, parto prolongado, Pinzamiento tardío del cordón, Asma maternal, Diabetes gestacional, IUU.

FACTORES NEONATALES:

* RN masculino, Apgar < 7 y macrosomía.

Una radiografía de tórax muestra hiperaeración con 8 o 9 espacios intercostales visibles, horizontalización de parrilla costal y aplanamiento de los hemidiafragma, cardiomegalia e infiltrado intersticial parahiliar por aumento de la vascularidad pulmonar.

El tratamiento consiste en incrementar la vasodilatación pulmonar y la presión de la vía aérea, con la finalidad que el aire desplace el líquido al intersticio para que pueda ser absorbido.

- Oxígeno complementario 40%. Cero cefalico
- CPAP nasal con F_iO_2 40-60%.
- Evitar uso de diuréticos, infusiones de albúmina y soluciones hipertónicas.