



**UNIVERSIDAD
DEL SURESTE**



ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

PEDIATRIA

RESEUMEN

Dr. ANZHONY ROBLES

Presenta:

- **Adrián Espino Pérez**

Enterocolitis Necrotizante

Es la urgencia del sistema digestivo más frecuente en el periodo neonatal; afectando predominantemente al pretérmino con muy bajo peso, se da entre el 6 a 7% en la población. Se considera una enfermedad multifactorial, teniendo la prematuridad como el principal factor de riesgo. Se a visto relación con inmadurez del tracto gastrointestinal y la disminución de la motilidad favoreciendo la translocación bacteriana. Su diagnóstico puede resultar complejo y tardío, los síntomas pueden aparecer durante la 2da o 3ra semana de vida incluso hasta los 3 meses. Las manifestaciones inespecíficas, tales como del letargo, cambios en el patrón de la temperatura, cambios en el patrón alimentario, sensibilidad gástrica y poca distensión abd.

F

CRITERIOS DE BELL

IA	Sospecha	inestabilidad de la temperatura apnea, bradicardia, letargo
IB	Sospecha	Igual ↑
IIA	Definitivo leve	Igual ↑
IIB	Definitivo moderado	Acidosis m. leve Anosmia, leucopenia
IIIA	Definitivo avanzado I. Intacto	hipotensión, bradicardia apnea grave, acidosis respiratoria, DIC, neutrofilia
IIIB	Definitivo avanzado intestino perforado	Igual ↑

BIBLIOGRAFIA:

Kliegman, R. M., Stanton, B. F., St Geme III, J. W., & Schor, N. F. (2016). Enterocolitis necrosante. En Nelson Tratado de Pediatría (págs. 909-911). Barcelona: Elsevier.