

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

“FIMOSIS Y CIRCUNCISIÓN”

Presenta: Francisco Javier Méndez López

MATERIA: PEDIATRIA

Semestre: 6°

Grupo: “B”

Fimosis y Circuncisión.

El prepucio es la piel que recubre el glande y tiene como función proteger al meato uretral y al glande. La fimosis es la incapacidad para retraer manualmente el prepucio por detrás del surco balanoprepucial y por lo tanto, no es posible descubrir el glande.

La fimosis se caracteriza en fisiológica y patológica:

- Fimosis fisiológica.

Durante los primeros 3-4 años de vida la fimosis se considera fisiológica.

- Fimosis patológica.

Persistencia de dificultad para retraer el prepucio en un niño mayor de 4 años entre sus causas se encuentran las cicatrices distales del prepucio o fibrosis.

La fimosis patológica puede presentar dolor, hematuria, globo prepucial, irritación en el glande y/o prepucio, balanitis recurrente, disuria, episodios frecuentes de infecciones urinarias y erecciones dolorosas.

El diagnóstico de la fimosis es clínico. No es necesario realizar exámenes de laboratorio o imagen; dando tratamiento de primera línea esteroides tópicos llegando a circuncisión.



BIBLIOGRAFIA

Michelle Oconitrillo Chaves; FIMOSIS EN NIÑOS; REVISTA MEDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA LXXIII (619) 261 - 263, 2016.

