

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ESCUELA DE MEDICINA

“ANEMIAS DEL RECIEN NACIDO”

Presenta: Francisco Javier Méndez López

MATERIA: PEDIATRIA

Semestre: 6°

Grupo: “B”

Factores maternos relacionados con la anemia en recién nacidos preterminos...

La anemia en los neonatos preterminos se define como la disminución de los glóbulos rojos, hemoglobina o del hematocrito relacionados a la edad gestacional, es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, por ello se ha realizado una investigación que relacione los factores de riesgo maternos que se involucran con la aparición de la anemia en prematuros.

De una muestra de 32 a 37 semanas de gestación se obtuvo como resultado que el 56% de los pacientes correspondió al sexo masculino, el 72% se encontró entre los 32 a 37 semanas de gestación, en el 75% de los casos se realizó un oportuno pinzamiento del cordón umbilical, la causa más común de anemia neonatal en estos pacientes fueron las hemorragias internas en el 25% de los casos seguidos de las malformaciones de vasos umbilicales en el 22% de los casos las madres de los afectados eran en el 38% de los casos mujeres añosas y multiparas y el 25% de las mujeres tenían como antecedentes patológico placenta previa.

La anemia del recién nacido está considerada: en recién nacidos \geq de 28 de semanas: hb de 13g/dl, en recién nacido \leq de 28 semanas: hb de 12g/dl

en general se considera anemia a recién nacidos con valores menores a 15 g/dl de hb o hto central menor a 45%

Durante el estudio el periodo de estudio de los 32 casos de anemia en prematuros, predominando el genero masculino con 56% quedando así el genero femenino con un 44%; indicando que el genero masculino es más susceptible a afectaciones sistémicas, la carga hormonal protege al genero femenino.

En cuanto a las semanas de gestación se determino que de los 32 casos de anemia diagnosticados existieron 2 casos en prematuros de menos de 28 semanas de gestación con un 6%, 7 casos en prematuros de 28 a 32 semanas de gestación dando un 22% y por último con un mayor porcentaje 23 casos de anemia en prematuros de 32 a 37 semanas de gestación proporcionando un 72%.

En los diagnosticados con anemia existió un mayor porcentaje de pinzamiento de cordón de 30 a 60 segundos con un 75%. Y en factores de riesgo se determinaron casos por hemorragias feto-materna; fetomembranas, accidentes obstétricos, malformaciones.

BIBLIOGRAFIA

Dra. Fernández Díaz Nayvi Cecilia ; Chávez Salazar Edgar Eduardo ; Salazar Alvarez Carmen Andreina; Factores maternos relacionados con la anemia en recién nacidos pretérminos; Universidad de Chile Servicio Salud Metropolitano Norte Facultad de Medicina; Hospital Clínico de Niños Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil; Rev. Ped. Elec. [en línea] 2016, Vol 13, N° 1. ISSN 0718-0918.

