



**UNIVERSIDAD
DEL SURESTE**



ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

PEDIATRIA

**TROMBOSIS DE LA VENA
RENAL**

Dr. Jeffery Anzhony Cruz Robles

Presenta:

Víctor Daniel González Hernández

18 de Mayo del 2021, Comitán, Chiapas.

Vista Daniel González Hernández
Dr. Jeffery Anthony Cruz Roales

La trombosis de las venas centrales o de sus
ramificaciones es una entidad que se presenta
con muy poca frecuencia y en que algunas veces
puede pasar desapercibida. La incidencia
global de tromboembolismo en el periodo neonatal
es de 5 por 100000 nacimientos. La trombop-
tiosis renal es la manifestación tromboembóli-
ca frecuente en esta edad. Entre los factores
predisponentes (genéticos y adquiridos) del
estado protrombótico la trombosis renal
neonatal es espontánea y solo en raras
ocasiones se asocia a la presencia de
celulitis (a menudo ganglionar) o
especialmente vulnerable a la trombosis como
consecuencia de una disminución del flujo
sanguíneo. Esto puede producirse en neonatos
con shock e hipoperfusión renal, lo que
origina una vasoconstricción arterial intrarenal
y disminución del flujo venoso.

La trombopos venosa renal comienza en las
vegas intrarenales de pequeño calibre
El trombo puede diseminarse a la corteza
o a la médula adrenal de las venas
interlobulares de mayor calibre hasta la
vena renal principal y la vena pava-
inferior. El rison requiere se afecta con
mayor frecuencia. La clínica usual en el neonato
asociada a hematuria, proteinuria, oliguria o
anuria del síndrome renal en sangre,
hipertensión, trombocitopenia y disminución de
la fracción renal.