



Universidad del Sureste Escuela de Medicina



ESTENOSIS PILORICA

MATERIA

PEDIATRIA

**DOCENTE:
DR. JEFFERY ANZHONY CRUZ**

**PRESENTA
GONZÁLEZ REQUENA NYMSSI MICHELL**

Comitán de Domínguez, Chiapas a abril del 2021

Estenosis Pílorica

Es la causa más común de obstrucción intestinal alta en el neonato, después de la segunda semana de vida y la causa quirúrgica más común de vómitos en infantes. Se desconoce su etiología. Se caracteriza por una marcada hipertrofia e hiperplasia progresivas de las fibras musculares que forman el esfínter pilórico que obstruye progresivamente el canal pilórico.

Clinica.

- * Vómitos en proyectil, sin bilis, iniciados alrededor de la tercera semana de vida.
- * Ondas peristálticas gástricas visibles.
- * Palpación de oliva gástrica.
- * Generalmente se observa en varones.

Diagnostico.

- * El diagnostico es clinico.
- * El dx. temprano evita deshidratación, alcalosis metabólica hipocloremica, desnutrición.

Tratamiento.

- * Quirúrgico
- Píloro miotomía de Fredet-Ramstedt.

Epidemiología.

- Incidencia 1.5 a 3 casos por cada 1000 nacimientos.
- Mortalidad 0.5 a 1%. si el diagnostico se realiza de manera temprana.
- La letalidad es mayor si existen otros trastornos patológicos subyacentes o complicaciones.