



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESCUELA DE MEDICINA

6to Semestre

Grupo "B"

PEDIATRIA

RESUMEN

Dr. ANZHONY ROBLES

Presenta:

- **Adrián Espino Pérez**

Estenosis Pílorica

Es una patología quirúrgica común en la edad pediátrica. A pesar de ser una condición frecuente, su etiología aún no es clara. La presentación clínica corresponde a vómitos explosivos lácteos, no biliosos y en algunos casos oliva palpable en el abdomen o ondas peristálticas luego de ser alimentado.

Inicialmente el lactante se encuentra hambriento lo que manifiesta con irritabilidad, inquietud y llanto intenso del vómito posteriormente, secundario al ayuno y los vómitos, se puede presentar deshidratación de grado variable que depende más de la intensidad del cuadro que de la duración de este.

El diagnóstico es clínico pero debería corroborarse con estudios complementarios como la ecografía abdominal, endoscopia digestiva alta.

El tratamiento es quirúrgico esto consiste en piloromiotomía, consiste en la sección quirúrgica de la capa sero-muscular del píloro, sin cortar la mucosa, en sentido del eje mayor de este. Permitiendo así la protrusión de la mucosa con lo que normaliza el diámetro del canal pilórico.

BIBLIOGRAFÍA:

Romero Morgado,G. (2019). Revisión de Estenosis Hipertrófica del Píloro. Revista Pediatría Electrónica, 13(3), 1–6.