



DOCENTE:

ALUMNA: PAOLA PINTO PEREZ

MATERIA: ENFERMERIA DEL ADULTO

CARRERA: LIC. ENFEMERIA

CUATRI:6

PICHUCALCO, CHIS. JULIO, 2021

PROTOCOLO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON BRONCONEUMONIA

La bronconeumonía es la inflamación de los bronquiolos finos y sacos alveolares de los pulmones, producida generalmente por virus y bacterias. Los bronquiolos son los pequeños conductos que hay dentro de los pulmones. Cuando una persona respira, el aire entra en la tráquea y baja hacia los pulmones a través de una serie de conductos que se ramifican, llamados “bronquios”. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican para formar bronquiolos, que son de menor tamaño y terminan en millones de diminutas bolsas de aire (los alvéolos).

SINTOMAS

Los síntomas de la bronconeumonía pueden ser como los de otros tipos de neumonía. Esta afección con frecuencia empieza con síntomas similares a los de la gripe, que pueden convertirse en más graves al transcurrir unos pocos días.

- **fiebre**
- **tos con moco**
- **dificultad para respirar**
- **dolor de pecho**
- **respiración acelerada**
- **sudoración**
- **escalofríos**
- **dolores de cabeza**
- **dolores musculares**
- **pleuresía, o dolor de pecho debido a la inflamación por tos excesiva**
- **fatiga**
- **confusión o delirio, especialmente en personas mayores**

Los síntomas pueden ser especialmente graves en personas con sistemas inmunitarios debilitados o con otras enfermedades.

LOS SINTOMAS EN LOS NIÑOS

Los niños y bebés pueden mostrar síntomas distintos. Aunque la tos es el síntoma más común en los bebés, también pueden tener:

- **un ritmo cardíaco rápido**
- **niveles bajos de oxígeno en la sangre**
- **contracción de los músculos del pecho**
- **Irritabilidad**
- **disminución en el interés por alimentarse, comer o beber**
- **fiebre**
- **congestión**
- **dificultad para dormir**

Comunícate con tu médico de inmediato si tienes síntomas de neumonía. Es imposible saber qué tipo de neumonía tienes sin que tu médico haga un examen minucioso.

¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar bronconeumonía?

Existen varios factores que pueden incrementar tu riesgo de desarrollar bronconeumonía. Entre ellos:

Edad: Las personas que son mayores de 65 años, y los niños menores de 2 años, tienen mayor riesgo de desarrollar bronconeumonía y complicaciones de la afección.

Ambiente: Las personas que trabajan o que con frecuencia visitan hospitales u hogares de adultos mayores tienen un mayor riesgo de desarrollar bronconeumonía.

Estilo de vida: Fumar, mala nutrición y un historial de fuerte uso de alcohol pueden incrementar tu riesgo de bronconeumonía.

Clasificación

Existen dos tipos de neumonía: la lobular y la bronquial. La neumonía lobular afecta una o más secciones (lóbulos) de los pulmones. En cambio, la bronconeumonía afecta los pulmones y los bronquios y puede ser grave o leve; la bronconeumonía vírica suele ser menos grave.