

- **Materia:** Zootecnia de aves
- **Tema:** Calendario de vacunación/desparasitación
- **Carrera:** Medicina veterinaria y zootecnia
- **Cuatrimestre:** 6º
- **Alumno:** Edgar Uriel Encino López

**CALENDARIO DE VACUNACION
Y
DESPARACITACION EN AVES**

**POLLOS
DE ENGORDA**

EDAD:	ENFERMEDAD:	CEPA:	METODO:
• 1 Día	Marek	HVT c.a.	S.c, I.m
• 1-7 Días	Bronquitis infecciosa	Massachusetts	Ocular/ Aspersión
• " "	Newcastle	Hitchner B1 o La sota clonada	" "
• 7- 10 Dias	Gumboro	Tipo intermedio por gota gruesa	agua de bebida, O, Aspersión
• 18-21 Dias	Gumboro	Tipo intermedio	" "
• 25-28 Dias	Newcastle	Tipo intermedio	" "

**GALLINAS
PONEDORAS**

EDAD	ENFERMEDAD	CEPA	METODO
• 1 Día	Marek	Rispens/HVT +SB1 c.a.	s.c/ i.m
• 1-7 Dias	Bronquitis infecciosa	Massachusetts	ocular/ aspersión g.g
• 1-7 Dias	Newcastle.	Hitchner B1 o Lasotaclonada	" "
• Opcional	Newcastle	vacuna inactivada	s.c/ i.m
• 25-28 Dias	Newcastle	Tipo Lasota	agua de bebida, ocular, a.g.g
• 25- 28Dias	Gumboro	tipo intermedio	" "
• 35-38Dias	Gumboro	tipo intermedio	" "
• 8 semanas	B.I	Massachusetts	" "
• Opcional	Newcastle	vacuna inactivada	s.c / i.m
• 6-12 sem.	Encefalomiелitis/ V.A		Punción alar
• 6-12 sem.	Micoplasma gallisepticum	vacuna viva	Asperción g. fina
• 18 sem.	Inactivada: N., B.I, S.B.P		s.c / i.m

PATO

EDAD	ENFERMEDAD	FECUENCIA	VIA APLICACIÓN
• 2-3 Dias	Newcastle	Unica	ocular, nasal, oral
• 3 semana	Colera aviar	Unica	punción en ala
• 4 semana	Viruela Aviar	Unica	Intramuscular
• Adultos/patitos	piperasina	3 dias C/3 meses	oral

PAVOS

EDAD	ENFERMEDAD	FRECUENCIA	APLICACIÓN	CEPA
• 12 Dias	Newcastle	1º dosis	ocular	Virus vivo B1
• 12 Semanas	Newcastle	2º dosis		" "
• 7 Dias	Diftero viruela aviar	1º dosis	por raspaje	virus vivo de pavo
• 14 semanas	Diftero viruela aviar	2º dosis		" "
• 7 Dias	E. crónica respiratoria	1º dosis	s.c	
• 12 semanas	E. crónica respiratoria	2 º dosis	s.c	
• 8 semanas	cólera aviar	1º dosis	s.c	
• A partir de la cuarta semana suministrar Piperazina a todos los animales. (Desparasitación). Repetir a las catorce semanas				
• Cuarta semana suministrar Dimetridazole (prevención de Histomoniasis). A las doce semanas de vida repetir tratamiento				