

- **Materia: ZOOTECNIA DE AVES**
- **Tema: CALENDARIO DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN EN AVES**

• **Carrera: MVZ**

• **Cuatrimestre: 6°**

• **Alumno: Alexa Yomara Téllez Méndez**

• **Parcial 3**

CALENDARIO DE VACUNACIÓN Y DESPARACITACION EN AVES

Existen dos métodos por los que un animal puede inmunizarse o quedar protegido contra una enfermedad infecciosa.

Uno de ellos, llamado inmunización pasiva, es aquella que se obtiene de las madres o por la administración de

suero hiperinmune; produce una resistencia temporal, al transferir anticuerpos de un animal resistente a uno susceptible, éstos dan una protección

inmediata pero se desvanece y el receptor vuelve a ser susceptible a la reinfección. De aquí se desprende la necesidad de hacer una adecuada vacunación en las madres, para que las crías logren una buena protección en las primeras etapas de su vida.

El segundo es el llamado inmunización activa, es la administración de antígenos a un animal para que desarrolle una inmunidad más sólida que sea de tipo protector, no se logra una protección inmediata pero es de larga duración y capaz de ser reestimulada, la que se logra a través de la vacunación, se utilizan virus o bacterias modificadas ya sea vivos o muertos, para producir los anticuerpos (protección), pero no la enfermedad.

Pollos de engorda (Vacunación)

| vacuna | enfermedad | 1er aplic. | 2da aplic. | 3er aplic. | Vía de aplic. |
|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|
| Advac | Newwclaste | 1° a 2° semanas de edad | 3° a 6° semanas de edad | Cada 3 a 4 meses, según la incidencia. | Ocular Nasal oral |
| Advac viruela aviar | Viruela | 1°-2° de edad. | 1 – 2 semana de edad | En zonas donde allá moscos, aplic. Antes de las lluvias | Intradérmica en el pliegue del ala |
| Advac triple aviar plus | Newclaste Cólera aviar Coriza infecciosa | De 10 a 30 días o más de 30 días. | A los 21 días | | intramuscular |

Desparasitación pollos de engorda

Coccidiosis: que ataca el sistema digestivo; en especial el intestino delgado, los ciegos y el intestino grueso.

Tratamiento: es la sulfaquinoxalina, aunque en caso de no poder conseguirla en el mercado, se puede utilizar la sulfasuccidina o sulfametazina para uso humano

Tenías: Tratamiento: Se recomienda el uso de vermífugos triple para la eliminación de las tenías, el cual también elimina las otras lombrices redondas

Piojos: Tratamiento: Si encuentra liendres o piojos adultos, se debe atomizar todos los animales con malatión, a razón de 3-4 ml por litro de agua. La aplicación deberá realizarse con preferencia en horas de la noche y con un mínimo de luz, cuando los animales estén en reposo o más tranquilos

Gallinas de postura (vacunación)

| vacuna | enfermedad | 1er aplic. | 2da aplic. | 3er aplic. | Vía de aplic. |
|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| Advac | Newwclaste | 1° a 2° semanas de edad | 3° a 6° semanas de edad | Cada 3 a 4 meses, según la incidencia. | Ocular Nasal oral |
| Advac viruela aviar | Viruela | . 1° a 2° semanas de edad | 12 a 16 semanas de edad | 3 a 5 semanas antes de la postura | Intradérmica en el pliegue del ala. |
| Advac triple aviar plus | Newclaste Cólera aviar Coriza infecciosa | De 10 a 30 días o más de 30 días. | A los 21 días | | intramuscular |

Desparasitación Gallinas de postura

Cecales y Coccidiosis: Tratamiento: es la sulfaquinoxalina

Garrapatas: Su control se realiza con malatión

Pavos (vacunación)

| vacuna | enfermedad | 1er aplic. | 2da aplic. | 3er aplic. | Vía de aplic. |
|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|--|
| Advac | Newwclaste | 1° a 2° semanas de edad | 3° a 6° semanas de edad | Cada 3 a 4 meses, según la incidencia. | Ocular Nasal oral |
| Advac viruela aviar | Viruela | . 3 a 4 meses de edad. | | 1 a 2 meses antes del inicio de la reproducción | Intradérmica en el pliegue del muslo y el abdomen. |
| Advac triple aviar plus | Newclaste Cólera aviar Coriza infecciosa | De 10 a 30 días o más de 30 días. | A los 21 días | | intramuscular |

Desparasitación pavos

Ascaris y Cecales: Tratamiento: El uso de piperazina es el más indicado para eliminar el áscaris.

Otros Acaros: Tratamiento: El tratamiento es similar al de los piojos, es decir se atomizan las aves con malatión, de 3-4 ml por litro de agua, pudiendo repetir si fuera necesario