miMind


MANEJO DE AVES DE POSTURA
SELECCIÓN DE EJEMPLARES
Dependerá
TIPO
De
PRODUCCIÓN
CLIMA
De
ZONA DE PRODUCCIÓN
LÍNEAS GENÉTICAS
LIVIANAS
Poseen
PLUMAS
BLANCO CASTAÑO
NO ENCLUECAN
BAJA
GANANCIA DE PESO
310-320 HUEVO/AÑO
HUEVO
MARRÓN/ BLANCO
ESBELTEZ
Por ejemplo
RAZA
LOHMANN LSL
LOHMANN BROWN CLASSIC
HISEX WHITE
LEGHORN
PESADAS
Poseen
BUENA CONDICIÓN CORPORAL
DOCILIDAD
HUEVOS PEQUEÑOS
RUSTICIDAD
175-182 HUEVOS/AÑO
Por ejemplo
RAZA
ROSS
ARBOR ACRES
HUBBARD
COBB
SEMI-PESADAS
Poseen
RESISTENCIA
BUENA POSTURA
PLUMAJE CASTAÑO
CAPACIDAD DE ENGORDE
260-320 HUEVOS/AÑO
Por ejemplo
RAZA
PLYMOUTH ROCK
RHODE ISLAND RED
RHODE ISLAND
SUSSEX
ISA BROWN
MANEJO EN CRIANZA
CRÍA Y RECRÍA
Comprende
PERIODO DE ARRANQUE
Hasta
SEMANA 6 DE VIDA
FASE DE CRÍA
Desde
7A. SEMANA
A la
13 A. SEMANA
FASE DE RECRÍA
Desde
13A. SEMANA
A la
18A. SEMANA
TEMPERATURA
34-35 °C
HUMEDAD
60-70%
SISTEMAS DE ALOJAMIENTO
JAULAS
Con
RECOGIDA AUTOMÁTICA
De
EXCRETA
SUELO
La
CAMA
Es
ESENCIAL
AVIARIOS
CORTE DE PICOS
Durante
10 PRIMEROS DÍAS DE VIDA
Reduce
PICAJE
CANIBALISMO
ALIMENTACIÓN
Puede ser
AD LIBITUM
CUIDAR
SATISFACCIÓN
De
NUTRIENTES
MANEJO EN DESARROLLO
SISTEMAS DE ALOJAMIENTO
JAULAS
750 cm2/ave
12 cm/ave de comedero
NIDAL
JAULAS GET-AWAY O WELFARE
1 m2/20 gallinas
SEMI-LIBERTAD
Dispone
SALIDA
Al
PATIO EXTERIOR
TEMPERATURA
21-23 °C
HUMEDAD RELATIVA
50-70%
ALIMENTACIÓN
Ajustar a
NECESIDADES
De las
GALLINAS
Puede administrarse
PIENSO
De
1A. FASE
Desde
5%
Hasta
PASADO PICO DE PUESTA
2A.FASE
Durante
MESETA
De
CURVA
De
PUESTA DE HUEVOS
3A. FASE/ FINAL
Indicado
REDUCCIÓN
De
PRODUCCIÓN DE HUEVOS
MANEJO DE LA REPRODUCCIÓN
Realizado en
NAVES EN SUELO
MADRUEZ SEXUAL
23 SEMANAS (161 DÍAS)
MADUREZ FÍSICA
30 SEMANAS (210 DÍAS)
CONTROLAR
PESO CORPORAL
SEMANAL
CONDICIÓN FÍSICA
CRECIMIENTO MENSUAL
CAMBIOS
En
TIEMPO
De
CONSUMO DE ALIMENTO
ALIMENTACIÓN
Puede usarse
ARRANQUE
0-20 DÍAS/ 4A. SEMANAS
Administrado
AD LIBITUM
CRÍA
20-41 DÍAS
CRECIMIENTO
42-104 DÍAS
Administración
CONTROLADA
PRE-PUESTA
105 DÍAS- INICIÓ DE PUESTA
PIENSO MEJORADO
PUESTA
PIENSO
FASE Y
FASE II
MANEJO DE LA PELECHA
Aplicada
INCIO DE OTOÑO
77-88 SEMANAS DE VIDA
LIMITACIÓN DE AGUA Y COMIDA
Restricción de
ALIMENTO
Hasta que
AVE
Reduzca
25-30%
De
CONDICIÓN CORPORAL
Puede ser
RACIONES BAJAS
En
NUTRIMENTOS
UTILIZACIÓN
De
ADITIVOS ALIMENTICIOS
ANOVULATORIOS
CUIDAR
AMBIENTE EXTERNO
Debido a
POSIBLE
BAJA INMUNOLOGICA
Del
AVE