

**Nombre de estudiante:** Ángel de Jesús Trujillo Morales

**Nombre del profesor:** Guillermo Montesinos Moguel

**Nombre del trabajo:** Calendario de Desparasitación Y Vacunación

**Materia:** Producción Sustentable De Huevo

**Grado:** 9°

**Grupo:** “A”

## CALNEDARIO PARA CABECERA

VACUNA	ENFERMEDAD	PRIMERA APLICACIÓN	PSEGUNDA APLICACIÓN	TERCERA APLICACIÓN	DESPARASITANTE	TIEMPO	VÍA DE APLICACIÓN (DESP Y VACUNA)
<b>NEWCASTLE ARANDA</b>	NEWCASTLE	De la primera a las tercera semana de edad	De tres a cinco semanas	Cada 4 meses o según se presente la enfermedad	ALBENDAZOL MEBENDAZOL FEBENDAZOL	USAR DESPUÉS DE LAS PRIMERAS 16 SEMANAS	OCULAR, NASAL Y ORAL
<b>TRIPLE AVIAR BIOZOO</b>	NEWCASTLE, CÓLERA AVIAR, CORIZA INFECCIOSA	Dentro de las primeras 6 semanas	Dos semanas después de la primer aplicación	-----	TOLTRAZURIL PERMETRINA	DE NACIDOS Y CADA 6 MESES POSTERIORMENTE	INTRADÉRMICA ENTRE EL PLIEGUE DEL MUSLO Y EL ABDOMEN

## CALENDARIO PARA ZONA SELVA

VACUNA	ENFERMEDAD	PRIMER APLICACIÓN	SEGUNDA APLICACIÓN	TERCER APLICACIÓN	DESPARASITANTE	ENFERMEDAD	VÍA DE APLICACIÓN (DESP Y CAUNA)
<b>NEWCASTLE MAVER</b>	NEWCASTLE	De la primera a las tercera semana de edad	De tres a cinco semanas	Cada 4 meses o según se presente la enfermedad	TOLTRAZURIL PERMETRINA IVERMECTINA	USAR DESPUÉS DE LAS 12 SEMANAS DE NACIDOS	OCULAR, NASAL Y ORAL
<b>VIRUELA AVIAR BIOZOO</b>	VIRUELA	Primera a tercera semana	Dpues de los 3 meses en aves de postura y a las 3 en aves de engorde	Vacunar antes de las lluvias en zonas llenas de insectos como mosquitos	FEBENDAZOL ALBENDAZOL PIPERAZINA	Y POSTERIORMENTE CADA 4 MESES O CADA QUE SE REQUIERA USAR	Pliegue de la Ala
<b>MAREK FARBIOVET</b>	MAREK	PRIMER DÍA DE NACIMIENTO	De 3 a 6 semanas después de la primer dosis	-----	MEBENDAZOL ABAMECTINA	POR LA ZONA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS ANIMALES	PATA, O CUELLO.  ORAL