

CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO METODOLOGICO

El día domingo veintitrés de Mayo del año dos mil veintiuno se realizó la aplicación de las encuestas a las personas previstas de acuerdo a la muestra establecida consistente en quince personas que se encontraban en el barrio Cuernavaca en ese momento, la encuesta se llevó a cabo en un promedio de dos horas, por parte de las tesisistas profesionistas de Enfermería del 9° cuatrimestre. Único escolarizado del campus de la Frontera.

Cabe destacar que este proceso de investigación se llevó a cabo de manera satisfactoria obteniendo los resultados de participación deseados.


En el siguiente apartado se presentan los resultados a través de tablas y gráficas, que nos permitieron realizar un análisis e interpretación de la información para conocer la situación que prevalece respecto al fenómeno de efectos secundarios del implante subdérmico, en el Barrio Cuernavaca de Frontera Comalapa, que a su vez fue la base para la construcción de las recomendaciones y propuestas.

4.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

TABLA I. DATOS PERSONALES

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
EDAD	23-39	8	53
	29-39	7	47
	TOTAL	15	100%
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	13	87
	SECUNDARIA	2	13
	SUPERIOR	0	0
	SIN ESTUDIO	0	0
	TOTAL	15	100%
ESTADO CIVIL	SOLTERA	6	40
	CASADA	9	60
	CONVIVIENTE	0	0
	VIUDA	0	0
	TOTAL	15	100%
NUMERO DE HIJOS	1-3	12	80
	1-3	3	20
	TOTAL	15	100%
OCUPACION	AMA DE CASA	13	87
	TRABAJO SOCIAL	1	6
	QUIMICA	1	7
	TOTAL	15	100%

GRÁFICA 1




Análisis:

En la gráfica 1 mostró la distribución de la variable edad de las usuarias del implante subdérmico, la media se situó en 23-39, el grupo que más uso este método estuvo comprendido entre 23 a 29 años de edad con un porcentaje del 53% y las de 29 a 39 años con un porcentaje de 47%.

Interpretación:

El resultado de esta gráfica nos permite tener una idea general de las personas sobre el tema del implante subdérmico, ya que se obtuvo una cantidad de las opiniones de los dos grupos de edad representativos de la muestra.

GRÁFICA 2




Análisis:

Según la tabla anterior la mayoría de personas que eligió el implante subdérmico como método anticonceptivo cursaron los estudios primarios 87%, seguido de las pacientes que estudiaron la educación superior 13%.

Interpretación:

El resultado de esta gráfica nos refleja un dato de manera importante que la población encuestada cursaron la primaria.

GRÁFICA 3




Análisis:

En la tabla 3 se evidenció que las casadas tienen mayor frecuencia del uso del implante subdérmico con un el 60%, seguidas del estado civil solteras que corresponden al 40% y la minoría fueron las viudas y convivientes con un 0%.

Interpretación:

De manera relevante notamos con estos resultados la mayor parte de la población encuestadas son casadas.

GRÁFICA 4




Análisis:

En esta gráfica podemos notar que de acuerdo a nuestra planeación un mayor porcentaje correspondiente pertenece al 80% con 1 a 3 hijos mientras que el 20% restante corresponde a una edad de 3-5 hijos.

Interpretación:

En esta gráfica se observa que la mayoría de las mujeres encuestadas tienen de uno a tres hijos.

GRÁFICA 5



Análisis:

Según la ocupación de las portadoras del implante subdérmico, la mayor parte fueron amas de casa con un 87 %, seguidas de mujeres que tuvieron otro tipo de trabajos lo cual son química con un 7% y en menor porcentaje apreciamos a la de trabajo social con un 6%.


Interpretación:

En esta gráfica podemos observar que las mujeres encuestadas son amas de casa.

TABLA II EFECTOS SECUNDARIOS

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
PRESENTA / EFECTO SECUNDARIO	SI	13	87
	NO	2	13
	TOTAL	15	100%
EFECTOS SECUNDARIOS FRECUENTE EN IMPLANTE SUBDERMICO	CEFALEA, MIGRAÑA	2	13
	CICLOS MENSTRUALES	1	7
	AUMENTO DE PESO	11	73
	DEPRESION	1	7
	OTROS	0	0
	TOTAL	15	100%
ALTERACIONES SEXUALES DESPUES DE IMPLANTE	DISMINUCION	1	7
	AUMENTO	2	13
	DESAPARICION	12	80
	TOTAL	15	100%
PRESENCIA DE EFECTOS EN INSERCCION	ENROJECIMIENTO	0	0
	PRURITO	0	0
	SECRECION	0	0
	IRRITACION	1	7
	OTROS	14	93
	TOTAL	15	100%
CAMBIOS EN PESO CORPORAL	SI	15	100
	NO	0	0
	TOTAL	15	100%
EFECTOS ADVERSOS PSICOLOGICOS	IRRITABILIDAD	0	0
	ANSIEDAD	6	40
	NERVIOSISIMO	9	60
	TOTAL	15	100%
CONOCE EL METODO ANTICONCEPTIVO	SI	15	100
	NO	0	0
	TOTAL	15	100%

GRÁFICA 6




Análisis:

En esta gráfica nos indica que el 87 % de la población encuestada ha presentado efectos secundarios mientras que el otro 13% de ellas los efectos secundarios han sido unos porcentajes más bajos.

Interpretación:

Mediante esta gráfica nos refleja que la mayoría de las mujeres que han utilizado el implante subdérmico han presentado efectos secundarios.

GRÁFICA 7




Análisis:

Esta gráfica nos muestra que la población encuestada con el 73% presenta aumento de peso, también nos muestra que el 13% presenta cefalea y migraña, mientras que hay dos síntomas que tienen el mismo porcentaje el cual es depresión y los ciclos menstruales con un 7%.

Interpretación:

La información arrojada en esta gráfica nos permite tener una idea general acerca de los síntomas que se presentan o se hayan presentado en aquellas mujeres que han usado o estén usando el implante subdermico, pues el síntoma que se presenta más, es el aumento de peso mientras que en otras cefalea y migraña. Y el tercer porcentaje depresión y ciclos menstruales irregulares.

GRÁFICA 8




Análisis:

De acuerdo a la gráfica nos indica que el 80% de las mujeres han presentado desaparición del deseo sexual mientras que el 13% ha aumentado y en el porcentaje más bajo con un 7% ha disminuido.

Interpretación:

En esta gráfica podemos ver que las mujeres que han usado el implante subdérmico; en la mayoría a desaparecido el deseo sexual el cual es un efecto secundario del implante.

GRÁFICA 9



Análisis:

En esta gráfica se menciona que en el momento o después de la inserción del implante el 93% de la población ha presentado otro tipo de efectos, mientras que con un 7% de la población ha presentado irritación.

Interpretación:

De acuerdo a la gráfica nos ha reflejado que la mayoría de las usuarias no ha presentado ninguno de los síntomas mencionados.

GRÁFICA 10




Análisis:

De acuerdo a la gráfica nos indica que el 100% de toda la población encuestada ha presentado cambios en el peso corporal.

Interpretación:

En esta gráfica nos detalla claramente que todas las usuarias si han presentado cambios en su peso corporal después de la colocación del implante subdérmico.

GRÁFICA 11



Análisis:

En la tabla apreciamos los diferentes efectos adversos psicológicos que se identificaron en las pacientes luego de la colocación a lo cual se refirieron al nerviosismo con 60% y ansiedad con un 40%.


Interpretación:

Durante el periodo de su uso del implante subdérmico las pacientes refirieron haber presentado nerviosismo mientras utilizaban el implante subdérmico se identificaron en las pacientes luego de la colocación.

TABLA II EFECTOS SECUNDARIOS

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
LUGAR DE COLOCACION DE IMPLANTE	HOSPITAL PUBLICO	9	60
	SANATORIO PRIVADO	0	0
	CENTRO DE ATENCION	6	40
	OTROS	0	0
	TOTAL	15	100%
QUIEN ACOMPAÑO A LA COLOCACION DE IMPLANTE	SOLA	8	53
	PAREJA	3	20
	MADRE	2	13
	HERMANA/ PRIMA	1	7
	AMIGA	0	0
	OTROS	1	7
	TOTAL	15	100%
CREE QUE EL IMPLANTE ES UN METODO ANTICONCEPTIVO	MUY BUENO	1	7
	BUENO	2	13
	REGULAR	12	80
	MALO	0	0
	TOTAL	15	100%
RETIRO EL IMPLANTE ANTES DEL TIEMPO	SEMANA	0	0
	MES	0	0
	3 MESES	0	0
	6 MESES	11	73
	AL AÑO	3	20
	NO	1	7
	TOTAL	15	100%
ESCALA DE SATISFACCION CON EL METODO	5	0	0
	7	2	13
	8	11	74
	10	2	13
	TOTAL	15	100%

GRÁFICA 12




Análisis:

La tabla N° 13 muestra el lugar donde las usuarias se fueron a colocar el implante, la gráfica nos indica que el 60% fueron a un hospital público de su comunidad y un 40% en un centro de atención.

Interpretación:

En esta gráfica podemos ver que las mujeres que han instalado sus implante ha sido en un hospital.

GRÁFICA 13




Análisis:

En la gráfica se observa que la mayor parte de las usuarias fue acompañada por sus amigas con un 53%, ya que el 20% fue por su pareja, el 13% por su madre y el 7% que es la mínima fueron por otros y sola.

Interpretación:

En la gráfica se observa que más de la mitad de las usuarias fue acompañada por amigas.

GRÁFICA 14




Análisis:

Se puede observar el 80% de las usuarias creen que el implante es regular lo cual el 13% dice que es bueno y la mínima es de 7% lo cual es bueno para ellas.

Interpretación:

Observamos en la tabla anterior que en las usuarias manifestaron que el implante para ellas es regular que ya les ocasiona efectos adversos y que también lo liberan antes del tiempo acordado.

GRÁFICA 15




Análisis:

De acuerdo a la gráfica nos indica que 73% de las usuarias se han retirado el implante antes de tiempo en este caso se han retirado a los 6 meses, el 20% de la población de lo ha retirado al año y tenemos con un 6% a las usuarias que no se lo retiraron.

Interpretación:

De acuerdo a la gráfica nos ha reflejado que la mayoría de las usuarias se han retirado el implante antes de tiempo.

GRÁFICA 16



Análisis:

En nuestra gráfica detalla que de acuerdo a la escala de 1 al 10 de satisfacción del método un 73% de las usuarias se encontraron satisfechas un 8 en la escala, mientras y también se encuentran dos porcentajes iguales pero con satisfacción diferente en una de estas se encuentran satisfechas con un punto de 10 mientras que en la otra con un 7 en la escala y con el menor porcentaje de satisfacción con un 1%


Interpretación:

Nuestra gráfica indica que la mayoría se las usuarias según el grado de satisfacción se encuentran en un ocho de la escala mientras que la otra parte se encuentra entre el cinco y el diez de satisfechos y lo mínimo de satisfechos es con un siete en la escala.

TABLA II. EFECTOS SECUNDARIOS

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
MOTIVO POR COLOCACION DE IMPLANTE	EVITAR EL EMBARAZO	9	60
	YA NO DESEA MAS HIJOS	6	40
	TOTAL	15	100%
METODOS ANTICONCEPTIVOS QUE CONOCE	IMPLANON	15	100
	JADELLE	0	0
	NO CONOZCO	0	0
	TOTAL	15	100%
MOTIVO/ELECCION DE IMPLANTE (IMPLANON)	EFFECTIVIDAD	0	0
	COMODIDAD	0	0
	SEGURIDAD	13	87
	RECOMENDACION POR OTRAS PERSONAS	2	13
	TOTAL	15	100%
PERSONAL QUE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN	MEDICO	1	7
	OBSTETRIZ	0	0
	ENFERMERA	14	93
	INTERNOS/ MEDICINA	0	0
	OTROS	0	0
	TOTAL	15	100%
A UTILIZADO OTRO METODO	SI	3	20
	NO	12	80
	TOTAL	15	100%
QUIEN PROPORCIONO INFORMACION IMPLANTE	PADRES	0	0
	REVISTA/PERIODICOS	0	0
	PERSONAL SANITARIO	8	53
	VECINOS	7	47
	TOTAL	15	100%

Gráfica 17




Análisis:

Esta gráfica nos refleja el motivo por el cual se han colocado el implante con un 60% de las usuarias, el motivo fue evitar el embarazo, en cuanto al otro porcentaje con un 40% ya no desea más hijos.

Interpretación:

De acuerdo a los resultados de la gráfica podemos observar que la mayor parte de las usuarias deciden colocarse el implante para evitar en embarazo y por otro lado tenemos con porcentajes menos de la población optando por no desear tener mas hijos.

GRÁFICA 18




Análisis:

En esta gráfica nos indica que el 100% de la población conoce el implante llamado implanon.

Interpretación:

La población encuestada si tiene conocimiento del implante llamado implanon.

Gráfica 19




Análisis:

De acuerdo a la barra de pastel nos indica que el 87% de la población encuestada ha elegido el implante (implanon) por la seguridad de esta. Mientras que el 13% lo ha elegido por recomendaciones. De igual manera mencionamos efectividad, comodidad estas con un 0% de la población.

Interpretación:

El resultado de esta gráfica muestra que la mayoría de las usuarias han elegido el implante por su seguridad y con un porcentaje menos lo han elegido por algunas recomendaciones de vecinos, amigos o por padres de familia.

Gráfica 20




Análisis:

El personal que realizó el procedimiento con una mayoría fue el área de enfermería con un 93%, el mínimo fue de un 7% ya que fueron otros quien realizó el procedimiento.

Interpretación:

Al momento que se realizó las encuestas del total de las usuarias nos contestaron que al ingresar al área hospitalaria el procedimiento realizado fue llevado por el personal de enfermería.

GRÁFICA 21




Análisis:

En la tabla anterior señala que el 80% refirió no haber utilizado otro método lo cual el 20% nos dijeron que si han utilizado otros métodos de cuidados.

Interpretación:

En la tabla apreciamos que las usuarias identificaron que no han utilizado otros métodos anticonceptivos para sus cuidados.

GRÁFICA 22



Análisis:

El 53% de las usuarias fueron informadas por el personal sanitario, y el 47% fueron dichos por sus vecinos.


Interpretación:

Las pacientes que utilizaron el implante como método anticonceptivo fueron informadas por pláticas de sus centro de atención en donde ellas tuvieron conocimiento sobre este método.

TABLA II EFECTO SECUNDARIO

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
MOTIVO DE LA ELECCION DE IMPLANTE	TENER MAS HIJOS	13	87
	SANGRADO TRASVAGINAL	0	0
	CEFALEA	1	6
	AUMENTO DE PESO	1	7
	TOTAL	15	100%
COLOCACION IMPLANTE/ PARTO	SI	15	100
	NO	0	0
	TOTAL	15	100%
GRADO DE SATISFACCION	BUENO	1	7
	MUY BUENO	2	13
	REGULAR	12	80
	MALO	0	0
	TOTAL	15	100%
LE EXPLICARON SOBRE LOS EFECTOS / PATRON / SANGRADO	SI	13	87
	NO	2	13
	TOTAL	15	100%

GRÁFICA 24




Análisis:

El 100% de las usuarias utilizaron el implante después de un parto.

Interpretación:

Las pacientes encuestadas refieren que decidieron colocarse el implante después del parto.

GRÁFICA 25




Análisis:

De acuerdo a la gráfica nos indica que el grado de satisfacción del implante subdérmico fue regular con un 80%, mientras que muy bueno con el 13%, en tercer lugar tenemos con un grado de satisfacción bueno con el 7%.

Interpretación:

Los datos arrojados en la gráfica nos especifican que la mayoría de las usuarias según el grado de satisfacción es regular.

GRÁFICA 26



Análisis:

De acuerdo a la gráfica con un 87% de las usuarias no les explicaron sobre los efectos del patrón sangrado, mientras que con el 13% de las usuarias si les explicaron.


Interpretación:

En los datos arrojados en la gráfica podemos observar que a la mayor parte de las usuarias no les explicaron sobre los efectos secundarios que ellas podrían presentar esto es un dato muy importante ya que todo profesional debería dar sus indicaciones y contraindicaciones.

TABLA II EFECTOS SECUNDARIOS

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	%
CONTROL PARA REVISION	SEMANAL	1	7
	MENSUAL	12	80
	AL AÑO	0	0
	NO MENCIONO	2	13
	TOTAL	15	100%
VOLVERIA A UTILIZAR EL MISMO METODO	SI	2	13
	NO	13	87
	TOTAL	15	100%
LO RECOMENDARIA	SI	6	40
	NO	9	60
	TOTAL	15	100%
MOTIVO PARA ELEGIR EL IMPLANTE	COMODIDAD DE USO	1	6
	PRESIO	4	27
	EFFECTIVIDAD	10	67
	TOTAL	15	100%

GRÁFICA 27




Análisis:

De acuerdo a la gráfica los datos obtenidos fueron que 80% de la población acude mensual a su centro de control y con un 13% no menciona o no acude, mientras que con un 7% acude semanal.

Interpretación:

Según los resultados la mayoría de las usuarias acuden mensual al centro de control.

GRÁFICA 28



Análisis:

En esta gráfica nos arroja que el 87% de la población no volvería a utilizar el mismo método y el otro 13% si lo volvería a usar.

Interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos en la gráfica la mayor parte de las usuarias no volvería a utilizar este método ya que muchas sufren de cambios tanto físicos como alteraciones en las emociones.

GRÁFICA 29




Análisis:

De acuerdo a la población encuestada, la gráfica nos indica que el 60% de las usuarias no recomiendan usar este método, y el otro 40% si lo recomienda.

Interpretación:

Según los resultados obtenidos vemos claramente que la mayoría de las usuarias no lo recomiendan porque el implante no se adapta en el cuerpo de todas, es por eso que por sus experiencia han optado por esta alternativa de no recomendarla.

GRÁFICA 30



Análisis:

Según la gráfica nos indica que el 67% de las usuarias han elegido este implante por su efectividad, y con un 27% lo ha elegido por su precio y con el porcentaje más bajo con un 6% lo ha elegido por comodidad de uso.

Interpretación:

Los resultados obtenidos fueron que la mayor parte de la población ha elegido este método por su efectividad.