



UNIVERSIDAD DEL SURESTE.

TEMA: FARMACO.

DOSENTE: ELVI PILIASTRO.

ALUMNA: DANIELA RIOS GALLEGOS.

FECHA: 18/07/2021

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CHIAPAS:

ANALGÉSICOS

... IBUPROFENO ...

| Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis |
|--|---|---|
| <p>TABLETA O CAPSULA</p> <p>Cada tableta o capsula contiene: ibuprofeno 200 mg</p> <p>Envase con 10 tabletas</p> <p>Envase con 12 tabletas</p> <p>Envase con 20 tabletas</p> <p>Envase con 30 tabletas</p> | <p>• Dolor leve a moderado</p> <p>• Fiebre.</p> | <p>oral</p> <p>Adultos y niños mayores de 12 años</p> <p>200 a 400 mg cada 4 a 6 horas dependiendo de la intensidad de los síntomas, sin sobrepasar 1200 mg al día.</p> |

... METAMIZOL SODICO ...

| | | |
|--|--|---|
| <p>• Comprimido.</p> <p>Cada comprimido contiene Metamizol sodico 500mg</p> <p>Envase con 10 comprimidos</p> | <p>Fiebre</p> <p>Dolor agudo o cronico</p> <p>Algunos casos de dolor vesical</p> | <p>oral</p> <p>Adultos:</p> <p>De 500-1000 mg cada 6 o 8 horas.</p> |
|--|--|---|

... CLONIXLNATO DE LISINA ...

| | | |
|--|---|---|
| <p>Solucion Inyectable</p> <p>Cada ampolleta contiene: Clonixinato de lisina 100mg</p> <p>Envase con 5 ampollas de 2ml</p> | <p>Dolor leve a moderado</p> <p>Intensidad.</p> | <p>Intramuscular o Intravenosa</p> <p>Adultos 100mg cada 4 a 6 horas, dosis, Maxima 200mg cada 6 horas.</p> |
|--|---|---|

FENTANILO

| Descripcion | Indicaciones | Via de administracion y Dosis. |
|---|--|---|
| <p>Parche:</p> <p>Cada parche contiene Fentanilo 4.2mg</p> <p>Envase con 5 parches.</p> | <p>Dolor cronico</p> <p>Sindrome doloroso</p> <p>Dolor Intratable que requiera de analgesia opioide.</p> | <p>Transdermica</p> <p>Adulto.</p> <p>1.2mg cada 72 horas. Dosis maxima 10mg</p> <p>requiere receta de narcotico.</p> |

TRAMADOL - PARACETAMOL

| | | |
|--|--|---|
| <p>Tableta:</p> <p>Cada tableta contiene Clorhidrato de Tramadol Paracetamol 325.6mg</p> <p>Envase con 30 tabletas</p> | <p>Dolor de moderado a severo agudo o cronico.</p> | <p>oral. Adultos y mayores de 16 años de edad: 37.5mg/325mg a 75mg/650mg cada 6-8 horas, hasta un maximo de 300mg/2600mg por dia.</p> |
|--|--|---|

(Anestesia) ATROPIINA

| | | |
|--|--|---|
| <p>Solucion Inyectable</p> <p>Cada ampolleta tiene Sulfato de atropina 1mg</p> <p>Envase con 50 ampolletas con 1ml</p> | <p>preanestesia</p> <p>Arritmias cardiacas</p> <p>Bradicardia</p> <p>Bloqueo A-V</p> | <p>Intramuscular o Intravenosa</p> <p>Adultos: 0.5 a 1mg Dosis maxima 2mg</p> <p>Niños: 0.01 mg/kg de peso corporal cada 6 horas.</p> <p>pre anestesia 0.01 mg/kg de peso corporal, 45 a 60 minutos antes de la anestesia Dosis maxima 0.4mg.</p> |
|--|--|---|

DESFLEURANO ...

DLAZEPAM

| | | |
|--|---|--|
| Descripcion Liquido. Cada envase contiene: Desflurano 240ml Envases con 240ml | Indicaciones Indicacion y mantenimiento de la anestesia General | Via de administracion y Dosis. Inhalacion Adultos 2-12% Intravenosa Intravenosa o subcutanea Adultos: Broncopneumonia 12.5 a 25mg Hipertension Intravenosa o subcutanea de 250 somg Intravenosa lento 10025mg Dosis maxima 150mg/dia. Niños: Intravenosa 100 mg/m ² de superficie corporal o subcutanea 3 mg/kg de peso corporal/dia: Fracurar para cada 6 horas. Administracion diluido con solucion Intravenosa envejada en Frascos de vidrio. |
|--|---|--|

ETOMIDATO

| Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis. |
|--|-----------------------|---|
| Solución Inyectable cada ampollita tiene: Etomidato 20 mg Envase con 5 ampollitas con 10 ml | Inducción anestésica. | Intravenosa Adulto y niños mayores de 10 años 0.2 a 0.6 mg/kg de peso corporal Administrar diluido en soluciones Intravenosas en frascos de vidrio. |

ROCURONIO, BROMURO DE

| | | |
|---|--|---|
| Solución Inyectable Cada ampollita 5 Frasco contiene Bromuro de Rocuronio 50 mg | Relajación muscular Durante procedimiento quirúrgico. | Intravenosa Adulto: Dosis a juicio del especialista administrar diluido en soluciones intravenosas en frascos de vidrio. |
|---|--|---|

Cardiología. METOPROLOL.

| | | |
|--|--|--|
| Tableta cada tableta contiene tartrato de metoprolol 100 mg Envase con 20 tabletas. | Hipertensión arterial leve o moderada profilaxis en enfermedad isquemia miocárdica. | oral Adulto: 100 a 400 mg cada 12 horas profilaxis: 100 mg cada 12 horas |
|--|--|--|

PENTOXIFILINA

| Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis |
|--|--|---|
| Tableta o gragea de liberación prolongada: Cada tableta o gragea contiene pentoxifilina 400mg | Crecimiento Intermitente Insuficiencia vascular periférica. Insuficiencia cerebrovascular. | Oral Adulto: 400mg cada 8-12 horas. |

ADENOSINA

| | | |
|--|---|--|
| Solución Inyectable Cada Frasco Ampollo contiene adenosina 6mg envasado con 6 Frascos Ampollo con 2 ml. | Taquicardia paroxística supraventricular. | Intravenosa Adulto 3-6mg si no hay administración 6-12 mg Niños: 0.05 mg/kg de peso corporal se puede administrar una dosis máxima de 6.25mg/kg de peso corporal. |
|--|---|--|

LIBESARTAN

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| Tableta cada tableta contiene 150mg libesartan | Hipertensión arterial sistémica | Oral Adultos: 150-300mg una vez al día. |
|--|---------------------------------|---|

ISOSORBIDA, MONONITRATO DE

| Descripcion | Indicaciones | Via de administracion y Dosis |
|--|---|--|
| Tableta cada tableta contiene s-monittrato de. | Angina de pecho Infarto del miocardio Hipertension Arterial | oral Adultos: Tomar 20 o 40 mg cada |

Enfermedades

AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO

Infecciones o Parasitarias

| | | |
|--|-----------------------|--|
| Suspension oral cada frasco con polvo contiene Amoxicilina hidratada, equivalente 1.5g de amoxicilina. | infectivos sensibles. | oral. Adulto. de acuerdo a la amoxicilina: 500mg cada 8 horas Niños: De acuerdo a la amoxicilina: 20 o 40 mg/kg de peso corporal /dia divididos cada 8 horas. |
|--|-----------------------|--|

CETACLOR

| | | |
|---|---|--|
| Capsula cada capsula contiene: cetaclor monohidrato equivalente a 250mg de cetaclor | Infecciones producidas por bacterias gram positivas y gram negativas. | oral adultos: 250 a 500 mg cada 8 horas sin exceder de 4g/dia. |
|---|---|--|

CLINDAMICINA

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis. |
| Capsula Cada capsula contiene 300mg Tiene Clorhidrato de clindamicina equivalente a 300mg | Infecciones por bacterias Gram negativas | oral. Adultos: 300mg cada 6 horas. |

CLORAMFENICOL

| | | |
|---|---|--|
| Cada capsula contiene cloramfenicol 500mg | Infecciones por Gram negativas susceptibles | oral adultos y niños 50 a 100mg/kg de peso corporal/día cada 6 horas Dosis máxima 4g/día. |
|---|---|--|

ETAMBUTOL

Tabletas:
 Cada tableta contiene Clorhidrato de etambutol 1400mg

Tuberculosis

Oral
 Adultos:
 2 g/día durante dos meses (60 días).
 Niños mayores de 12 años:
 45 mg/kg de peso corporal/día durante dos meses (60 días).