


UDS
Mi Universidad

Farmacología

Actividad II

Cuadro de medicamentos

3er Cuatrimestre



Catedrático: E.P.P. Elvi Guadalupe Pilicastró Flores
Alumno: Jesús Alexis López Sánchez

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

a 14 de Julio de 2021

Cuadro básico y catálogo de medicamentos

Descripción	Indicaciones	Vía de administración Dosis
<p>Analgésicos</p> <p>Ácido acetilsalicílico</p>	<p>- Artritis reumatoide. - Osteoartritis - Espondilitis anquilosante - Fiebre reumática aguda. - Dolor o fiebre.</p>	<p>Oral adultos - Dolor o fiebre 250-500 mg cada 4 horas. - Artritis 500-1000 mg cada 4 o 6 horas.</p> <p>Oral niños - Dolor o fiebre 30-65 mg/kg de peso cada 6 o 8 horas.</p>
<p>Tableta o capsula</p> <p>Ibuprofeno 200mg</p> <p>Ibuprofeno 400mg</p> <p>Ibuprofeno 600mg</p> <p>Suspensión oral</p> <p>Cada 100 ml contiene: Ibuprofeno 40mg</p> <p>Cada mililitro contiene: Ibuprofeno 40mg</p>	<p>Dolor de leve a moderado</p>	<p>Oral niños y adultos, mayor de 12 años. 200 mg a 400 mg cada 4 a 6 horas, no exceder 1200 mg/día.</p> <p>Oral adultos y niños > 12 años. 400 mg cada 6 o 8 horas, sin exceder 1200 mg/día.</p> <p>Oral adultos y niños > 14 años. 600 mg cada 6 a 8 horas.</p> <p>Oral de 6 meses a 12 años. 6 a 10 mg/kg depende del sintoma cada 6 o 8 horas</p>
<p>Metamizol sódico</p> <p>Comprimido cada comprimido: Metamizol sódico 500mg</p> <p>Solución inyectable - cada ampolla Metamizol sódico 1g.</p>	<p>- Fiebre - Dolor agudo o crónico - Algunos casos de dolor visceral.</p>	<p>Oral Adultos 500-1000 mg cada 6 o 8 horas</p> <p>Intramuscular o intravenosa. Adultos. 1g cada 6 o 8 horas IM Profundo La 2 gr cada 12 horas por IV.</p>

<p>Paracetamol Tableta cada tableta contiene Paracetamol 500mg</p> <p>Solución Oral cada ml contiene: Paracetamol 100mg</p> <p>Supositorio cada supositorio: Paracetamol 100mg</p> <p>cada supositorio contiene: Paracetamol 300mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fiebre • Dolor agudo o crónico. 	<p>oral adultos 250-500 mg cada 4 a 6 horas.</p> <p>oral en niños De 10 a 30 mg/kg cada 4 o 6 horas</p> <p>Rectal en niños De 6 a 12 años 300 mg / 4 o 6 horas De 2 a 6 años 200 mg / 6 u 8 horas > 6 meses a un año 100 mg / 12 horas</p> <p>Rectal en adultos 300 a 600 mg cada 4 a 6 horas</p>
<p>Clonixinato de Lisina Solución inyectable Cada ampolla contiene: Lisina 100mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de leve a moderada intensidad. 	<p>Intramuscular o intravenosa Adultos: 100mg cada 4 a 6 horas, dosis máxima 200 mg cada 6 horas.</p>
<p>Ketorolaco Solución inyectable cada ampolla contiene: 30mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de leve a moderado 	<p>IU o IM en adultos. 30 mg cada 6 horas dosis máxima 120 mg/día. -no exceder el tratamiento 4 días.</p> <p>Niños 0.75 mg/kg cada 6 horas. Dosis máxima 60 mg/día -no exceder el tratamiento 2 días</p>
<p>Tramadol Solución inyectable cada ampolla contiene: 100mg</p> <p>Tableta de liberación Prolongada cada tableta contiene 150mg</p> <p>cada tableta contiene: 200mg</p>	<p>Dolor de moderado a severo de origen agudo o crónico Por</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fractura • Luxaciones • infarto agudo al miocardio • Cáncer 	<p>IM o IU en adultos y niños > de 17 años 50 a 100 mg cada 8 horas Dosis máxima 400 mg/día</p> <p>oral adultos Iniciar con 150mg/24 horas. -Ajustar lentamente en altura. -No exceder 400 mg/día.</p>

Anestesia		
<p>Diazepam Solución inyectable Cada ampolla contiene: 10 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> Medicación Preanestésica Sedación Ansiedad Síndrome convulsivo Contractura de músculo estriado 	<ul style="list-style-type: none"> 1 MO IV adultos 0.2 a 0.3 mg/kg de peso niños > a 10 kg 0.1 mg/kg, dosis única.
<p>Fentanilo Solución inyectable Cada ampolla contiene: 0.5 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anestesia general o local Dosis moderada intensificada durante la cirugía. 	<ul style="list-style-type: none"> IV en adultos 0.05 a 0.15 mg/kg IV en niños Dosis inicial 10 a 20 µg/kg.
<p>Vecuronio Solución inyectable frascoampolla con liofilizado contiene: 4mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> Relajación neuromuscular durante procedimientos quirúrgicos 	<ul style="list-style-type: none"> IV en adultos y niños > de 9 años inicial: 80 a 100 µg/kg Mantenimiento 10 a 15 µg/kg, 25 a 40 minutos de la dosis inicial
<p>Propofol Emulsión inyectable Cada ampolla contiene: propofol 200 mg en emulsión con clato de disodico</p> <p>• Cada ampolla contiene Propofol 200mg Solución con aceite de soya, fosfolipos de huevo O lecitina de huevo y glicerol</p> <p>• Cada ampolla o siringa contiene Propofol 500mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inducción y mantenimiento de la anestesia general 	<ul style="list-style-type: none"> IV o infusión continua Adultos: Inducción: 2.5 mg/kg (40 mg cada 10 minutos) Mantenimiento: 4 a 12 mg/kg/ hora. > de 8 años Inducción: 2.5 mg/kg Mantenimiento: 10 mg/kg/hora

Descripción	Indicaciones	Vía de administración Dosis
<p>Mide 20 lam</p> <p>Solución inyectable cada ampolla contiene: 5 mg</p> <p>Solución inyectable cada ampolla contiene: 15 mg</p> <p>Solución inyectable cada solución contiene 50 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • inducción anestésica • sedación 	<p>Vía Profunda o intravenosa</p> <p>Adultos</p> <p>IM 70 a 80 µg/kg de peso IV 35 µg/kg una hora antes del procedimiento quirúrgico.</p> <p>Dosis total 2-5 mg</p> <p>Niños</p> <p>IM Profunda o intravenosa</p> <p>Inducción 150 a 200 µg/kg, se- guido de 50 µg/kg de acuerdo al grado de inducción descada.</p>
<p>Tabletas</p> <p>cada tableta contiene meleato de nitrazolan 7.5 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • insomnio 	<p>Oral</p> <p>Adultos</p> <p>7.5 a 15 mg antes de dormir</p>

Cardiología

<p>Captopril</p> <p>Tableta cada tableta contiene: 25 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • hipertensión arterial sistémica • insuficiencia cardíaca. 	<p>Oral</p> <p>Adultos 25 a 50 mg cada 8 o 12 hrs</p> <p>En insuficiencia cardíaca, administrar 25 mg cada 8 o 12 horas</p> <p>Dosis máxima 450 mg/día</p> <p>Niños</p> <p>inicial 1.3 a 2.2 mg/kg. o 15 a 30 mg/kg cada 8 horas</p> <p>Dosis máxima 60 mg/kg</p> <p>insuficiencia cardíaca iniciar con 0.2 mg/kg e ir incrementando hasta 2.5 mg/kg cada 8 horas.</p>
<p>Enalapril o Lisinopril o Ramipril</p> <p>capsula o tableta cada capsula o tableta contiene:</p> <p>Meleato de enalapril 10mg 10mg</p> <p>Lisinopril 10mg</p> <p>Ramipril 10mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hipertensión arterial sistémica 	<p>Vía Oral</p> <p>Adultos</p> <p>inicial 10 mg al día / ajustar de acuerdo a la respuesta.</p> <p>Dosis habitual 10 a 40 mg/día.</p>
<p>Hidralazina</p> <p>Tableta</p> <p>cada tableta contiene:</p> <p>hidrato de hidralazina 10mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hipertensión arterial sistémica • insuficiencia cardíaca congestiva crónica • Preclampsia o eclampsia • crisis hipertensiva 	<p>Vía Oral</p> <p>inicial con 10 mg cada 6 o 12 horas</p> <p>Se puede incrementar hasta 150 mg/día.</p> <p>Niños</p> <p>0.75 a 1 mg/kg/día, dividido en 4 dosis</p> <p>Dosis máxima 4.0 mg/kg/día.</p>
<p>Solución inyectable cada ampolla contiene 10mg de Hidralazina</p>		<p>IM o IV lenta</p> <p>niños</p> <p>0.1 a 0.2 mg/kg cada 4 a 6 horas</p>
<p>Solución inyectable en ampolla o frasco contiene</p> <p>Hidralazina 20mg</p>		<p>IM o IV lenta</p> <p>Adultos</p> <p>20 a 40 mg</p> <p>Eclampsia 5 a 10 mg cada 20 minutos.</p>

Descripción	Indicaciones	Vía de administración y Dosis
<p>Metoprolol</p> <p>Tableta</p> <p>cada tableta contiene 100 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hipertensión arterial leve o moderada • Profilaxis en enfermedad isquémica miocárdica. 	<p>Vía oral</p> <p>Adulto</p> <p>100 a 400 mg cada 8 o 12 horas</p> <p>Profilaxis 100 mg cada 12 horas</p>
<p>Nifedipino</p> <p>Capsula de Gelatina blanca</p> <p>cada capsula contiene nifedipino 10 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Angina de pecho • Hipertensión arterial esencial 	<p>Vía oral</p> <p>Adultos 30 a 90 mg/día</p> <p>Fraccionado en tres tomas.</p> <p>Aumentar la dosis en periodo de 7 a 14 días hasta alcanzar el efecto deseado.</p> <p>Dosis máxima 120 mg/día</p>
<p>Losartan</p> <p>Gragea o comprimido recubierta</p> <p>cada gragea o comprimido contiene Losartan potásico 50 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hipertensión arterial sistólica 	<p>Vía oral</p> <p>Adultos</p> <p>50 mg cada 24 horas</p>
<p>Metildopa</p> <p>Tableta</p> <p>cada tableta contiene metildopa 250 mg</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hipertensión arterial 	<p>Vía oral</p> <p>Adultos 250 mg a 1 gr/día en tres tomas</p> <p>niños</p> <p>10 a 20 mg/kg/día en tres tomas.</p>