

❖ GLIBENCLAMIDA

DESCRIPCIÓN

TABLETA

Cada tableta contiene: Glibenclamida 5 mg.

INDICACIONES

Diabetes mellitus tipo 2.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Oral.

Adultos:

2.5 a 5 mg cada 24 horas, después de los alimentos. Dosis máxima 20 mg/día

❖ INSULINA

DESCRIPCIÓN

SUSPENSIÓN INYECTABLE

ACCION INTERMEDIA NPH

Cada ml contiene:

Insulina humana isófana (origen ADN recombinante) 100 UI.

Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI.

Envase con un frasco ampula con 5 ml.

Envase con un frasco ampula con 10 ml. SOLUCIÓN INYECTABLE

ACCION RAPIDA REGULAR

Cada ml contiene:

Insulina humana (origen ADN recombinante) 100 UI.

Insulina zinc isófana humana (origen ADN recombinante) 100 UI.

Envase con un frasco ampula con 5 ml.

Envase con un frasco ampula con 10 ml.

SUSPENSIÓN INYECTABLE
ACCION INTERMEDIA LENTA

Cada ml contiene:

Insulina zinc compuesta humana (origen ADN recombinante) 100 UI.

Envase con un frasco ámpula

INDICACIONES

Diabetes mellitus tipo 1. Acidosis y coma diabético.

Diabetes mellitus tipo 2 no controlada.

Hiperpotasemia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Subcutánea o intramuscular. Adultos y niños:

Las dosis deben ser ajustadas en cada caso y a juicio del médico especialista.

Subcutánea, intramuscular o intravenosa. Adultos y niños:

Las dosis deben ser ajustadas en cada caso y a juicio del médico especialista.

❖ **METFORMINA**

DESCRIPCIÓN

TABLETA

Cada tableta contiene: Clorhidrato de metformina 850 mg. Envase con 30 tabletas.

INDICACIONES

Diabetes mellitus tipo 2.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Oral.

Adultos:

850 mg cada 12 horas con los alimentos. Dosis máxima 2550 mg al día.

❖ **TOLBUTAMIDA**

DESCRIPCIÓN

Cada tableta contiene: Tolbutamida 500 mg. Envase con 50 tabletas.

INDICACIONES

Diabetes mellitus tipo 2

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Oral.

Adultos:

500 mg cada 8 ó 12 horas, con los alimentos. Dosis máxima 3 g/día

❖ **ATORVASTATINA**

DESCRIPCIÓN

TABLETA

Cada tableta contiene: Atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 20 mg de atorvastatina.

Envase con 10 tabletas.

INDICACIONES

Hipercolesterolemia.

Hiperlipidemias.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Oral.

Adultos:

20 mg cada 24 horas, incrementar la dosis según respuesta. Dosis máxima 80 mg/día.

