

## ANESTESIA

NOMBRE DEL MEDICAMENTO	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIS.
<b>DIAZEPAM</b>	Solución inyectable de 10 mg en vial envase con 50 ampollitas de 2ml	Preanestesia, sedación. Ansiedad. Síndrome convulsivo. contracción de músculo estriado	intramuscular o intravenoso adultos: 0.2 a 0.3 mg/kg niños con peso de 10kg 0.1 mg/kg
<b>DESFLURANO</b>	Líquido de 240 ml	Inducción y mantenimiento de la anestesia general.	Inhalación adultos, 2-12 años
<b>VECORANTO</b>	Solución inyectable -bule Frasco con 100 ml -filtrado contiene Bromuro de Vecoronio 4mg ampollitas con 1ml de diluyente y mg/ml	Relajación neuromuscular durante procedimientos quirúrgicos	intravenosa adultos y niños mayores de 9 años inicial: 80 a 100 μg/kg mantenimiento: 10 a 15 μg/kg después de la dosis inicial.
<b>*PRILLOCAINA</b> <b>*FELIPRESINA</b>	Solución inyectable cartucho dental Prilocaina: 54 mg Felipresina 90.054 mg envase 1 cartucho con 1.8 ml	Local por filtración Dolor durante procedimientos quirúrgicos. odontológicos.	Adultos: 1-2 cartuchos niños: 1/2 - 1 cartucho
<b>KETAMINA</b>	Solución inyectable clorhidrato de ketamina 500 mg envase con un frasco ampolla de 10 ml	inducción a la anestesia general	intravenosa o intramuscular Adultos y niños i.v 1 a 4.5 mg/kg i.m 5 a 10 mg/kg

## ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

NOMBRE DEL MEDICAMENTO	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES	VIA DE ADMINISTRACION Y DOSIS.
<b>AMPICILINA</b>	Tabletas o capsulas de 500 mg y 250 mg * suspensión oral de 60 ml cada 5ml equivalente 250	infecciones por bacterias y gram negativos y gram susceptibles.	oral / adultos niños: 2 a 4 g/día c/6hrs 50 a 100 mg/kg c/ 6 hrs.
<b>CEFALEXINA</b>	Tabletas o capsulas Cefalexina mono hidratada 500 mg envase con 20 tabletas.	Infecciones producidas por bacterias gram positivas y gram negativos susceptibles.	oral / adultos 500 mg c/ 6hrs dosis total 4g/día niños 25 a 100 mg/kg c/ 6 hrs dosis máxima 25 mg/kg
<b>RALTEGRAVIR</b>	comprimido de 400 mg	Infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1)	V.O. Adultos mayores de 16 años 400 mg c/12 hrs. Debe administrarse con otros.
<b>CLORAMFENICOL</b>	Sol. inyectable ampolla de 1g envase con diluyente de 5ml	febre tifoidea infecciones por gram negativos	i.v / i.m adultos y niños 50 a 100 mg/kg c/ 6 hrs Máximo 4 g/día
<b>AZITROMICINA</b>	Tabletas de 500 mg envase con 3 / 4 tabletas	infecciones ocasionadas por germen sensibles.	oral adultos 500 mg c/ 24 hrs