

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Nombre del alumno: Maricela Alvarez Ton.

Nombre del Profesor (a): Ntra. Ewi Guadalupe Pilcastro  
Flores

Licenciatura: Enfermería.

Materia: Farmacología

Nombre del trabajo: Cuadro básico de Medicamentos  
en México.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, julio 2021.

# FARMACOLOGIA

## MEDICAMENTOS.

### \* Analgesico.

#### PARACETAMOL

Descripción.

Tableta: Cada Tableta Contiene Paracetamol 500 mg  
Envase con 10 tabletas.

Indicaciones: Fibre; Dolor agudo o crónico.

Vía de administración y dosis: Oral.

Adultos

250-500 mg cada 4 o 6 horas.

Solución Oral: Cada ml Contiene Paracetamol 100 mg

Envase con 15 ml, gotero calibrado a 0.5 y 1 ml  
integrado adjunto al envase que sirve de etapa

Vía de administración y dosis: Oral

Niños:

De 10 a 30 mg/kg de peso corporal,  
cada 4 o 6 horas.

Supositorio: Cada Supositorio Contiene: Paracetamol 300 mg

Envase con 3 supositorios.

Cada supositorio Contiene: Paracetamol 100 mg

Envase con 3, 6 o 10 supositorios.

Vía de administración y dosis: Rectal

Adultos: 300-600 mg cada 4 o 6 horas

Niños: De 6 a 12 años: 300 mg cada 4 o 6 horas.

De 2 a 6 años: 100 mg cada 6 o 8 horas.

Mayores de 6 meses a un año: 100 mg cada 12 horas.

## TRAMADOL - PARACETAMOL

Descripción:

TABLETA: Pada tabletas Contiene:

Clorhidrato de Tramadol 37.5 mg

Paracetamol 325.0 mg

Envase con 20 tabletas.

Indicaciones: Dolor de moderado o severo, agudo o crónico.

Vía de administración y Dosis: Oral

Adultos y Mayores de 16 años de edad:

37.5 mg / 325 mg o 75 mg / 650 mg cada

6 o 8 horas, hasta un máximo de 300 mg /

2600 mg por día.

## ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

Descripción:

TABLETA: Pada tabletas Contiene: Ácido Acetilsalicílico 500 mg

Envase con 20 tabletas.

TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE: Pada tabletas soluble o eferves-

Dente Contiene: Ácido acetilsalicílico 300 mg

Envase con 20 tabletas solubles.

Indicaciones: Artritis reumatoide; Osteoartritis; Tendinitis  
angioedema; Fiebre reumática aguda; Dolor o fiebre

Vía de administración y Dosis: Oral

Adultos:

Dolor de cabeza: 250-500 mg cada 4 horas; Artritis: 500-1000 mg

Cada 4 o 6 horas.

Niños: Dolor o fiebre 30-60 mg / kg de peso pororal / dia. Dosis  
máximas: Pada 6 o 8 horas.

Fiebre reumática: 65 mg / kg de peso pororal / dia. Dosis  
máximas: Pada 6 o 8 horas.

## HETAHIZOL SODICO.

Descripción.

COMPRIMIDO: Pada 1 comprimido Contiene: Metahizol Sodico 500mg  
Envase con 10 comprimidos.

SOLUCIÓN INYECTABLE: Pada 1 ampolla Contiene: Metamizol Sodico 1g  
Envase con 3 ampollas con 2 ml

Indicaciones: Fibre; Dolor agudo escrótico, Alguno tipo de dolor visceral.

Vía de administración y dosis: Oral.

Adultos:

De 500 - 1000 mg cada 6 o 8 horas.

Intramuscular o intravenosa.

Adultos:

1 g cada 6 o 8 horas por vía intramuscular profunda.  
1 ó 2 g cada 12 horas por vía intravenosa.

## KETOROLACO.

Descripción.

SOLUCIÓN INYECTABLE: Cada frasco ampolla o ampolla

Contiene: Ketorolaco - trametamina 30mg

Envase con 3 frasco ampolla o 3 ampollas de 1 ml.

Indicaciones: Dolor de leve a moderado intenso.

Vía de administración y dosis: Intramuscular o intravenosa.

Adultos: 30 mg cada 6 horas, dosis máxima 120 mg / día.

El tratamiento no debe exceder de 4 días.

Niños: 0.75 mg/kg de peso corporal cada 6 horas. Dosis máxima 60 mg / día. El tratamiento no debe exceder de 2 días.

## Anestesia

### ATROPINA

Descripción.

Solución INYECTABLE: Cada ampolla contiene: Sulfato de Atropina 1 mg.  
Envase con 50 ampollas con 1 ml.

Indicaciones:

Preanestesia; Arritmias Cardiacas; Bradicardia; Bloqueo A-V

Vía de administración y Dosis.

Intramuscular o Intravenosa.

Adultos:

0.5 a 1 mg. Dosis máxima 2 mg.

Niños:

0.01 mg / kg de peso corporal, 45 a 60 minutos antes de la anestesia. Dosis máxima 0.4 mg.

### DESFLURANO

Descripción

LÍQUIDO: Cada envase contiene: Desflurano 240 ml  
Envase con 240 ml.

Indicaciones:

Inducción y mantenimiento de la anestesia general.

Vía de administración y Dosis.

Inhalación.

Adultos:

2-12 l.

## LIDOCAINA

Descripción.

Solución INYECTABLE AL 1%:

Cada frasco ampolla contiene: Clorhidrato de lidocaina 500 mg  
Envase con 5 frascos ampolla de 50 ml.

Solución INYECTABLE AL 2%:

Cada frasco ampolla contiene: Clorhidrato de lidocaina 1 g  
Envase con 5 frascos ampolla con 50 ml.

SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%:

Cada ampollleta contiene: Clorhidrato de lidocaina 100 mg  
Glucosa monohidratada 150 mg

Envase con 50 ampolletas con 2 ml.

SOLUCIÓN AL 10%:

Cada 100 ml contiene: Lidocaina 10.0 g.  
Envase con 115 ml con atomizador manual.

Indicaciones.

Anestesia local. Anestesia epidural (dolor);  
Anestesia regional. Arritmia ventricular (extrasístoles,  
taquicardia, fibrilación, ectopía).

Vía de administración y dosis.

Intravenosa.

Adulto.

- Antiarritmico: 1 o 1.5 mg/kg / dosis administrar lentamente.
- Mantenimiento: de 1 a 4 mg/min.
- Sólo administrar diluido en soluciones intravenosas  
envasadas en frasco de vidrio.

## CISATRACURIO

### Infiltación.

Niños y adultos:

- Dosis máxima 4.5 mg / kg de peso corporal o 300 mg.
- Anestesia local o epidural de 200 o 300 mg.
- Anestesia regional de 225 o 300 mg.
- No repetir la dosis en el transcurso de 2 horas.

Local Solución al 10%.

Aplicar en la región, de acuerdo a la indicación del médico especialista.

### CISATRACURIO, BESILATO.

Descripción.

Solución INYECTABLE.

Pasta ml contiene: Bromato de Cisatracurio equivalente de Cisatracurio 2mg

Envase con 1 Ampolla con 5 ml.

### Indicaciones.

Relajación neuromuscular.

Vía de administración y Dosis.

Intravenosa.

Adultos.

Inducción 0.15 mg / kg de peso corporal, mantenimiento: 0.02 mg / kg de peso corporal

Administrar diluido en soluciones intravenosas encerradas en frascos de vidrio.

## FENTANILO.

(Fentanil)

Descripción.

SOLUCION INYECTABLE.

Cada ampolla contiene: Etomidato 20 mg  
Envase con 5 ampollas con 10 ml.

Indicaciones.

Anestesia general o local.

Dolor de moderado intensidad durante la cirugía.

Vía de administración y Dosis.

Intravenosa.

Adultos:

0.05 a 0.15 mg / kg de peso corporal.

Niños:

Dosis inicial: 10 a 20 µg / kg de peso normal.

Dosis de mantenimiento a juicio del especialista.

Administrar diluido en soluciones intravenosas envasadas en frascos de vidrio.

# Cardiología

## EPINEFRINA

Descripción.

Solución INYECTABLE.

Cada ampolla contiene: Epinefrina 1mg (1:1000).  
Envase con 50 ampollas con 1 ml

Indicaciones.

Choque anafiláctico; Paro Cardíaco, Hemorragia Capilar;  
Broncoespasmo.

Vía de administración y dosis.

Subcutánea o intramuscular.

Intravenosa lenta (5 a 10 minutos).

Adultos:

Intravenosa: 0.1 o 0.25 mg

Subcutánea o intramuscular: 0.1 o 0.5 mg.

Niños:

Subcutánea: 0.01 mg / kg de peso corporal o 0.3 mg / m<sup>2</sup> de superficie corporal.

Intravenosa: 0.1 o 1.5 µg / kg de peso corporal

No exceder de 0.5 mg.

Administrar diluido en soluciones intravenosas envasadas en frascos de Vidrio.

## FELODIPINO

60 mg/100 mg

Alta Frecuencia

### Descripción.

TÁBLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA.

Cada tabletta contiene: Felodipino 5 mg.

Envase con 10 tabletas de liberación prolongada.

### Indicaciones:

Angina de Pecho, Hipertensión arterial sistémica.

Insuficiencia Cardiaca Congestiva.

### Vía de administración y Dosis.

Oral.

Adultos

5 a 10 mg / día.

Máximo 20 mg / día.

## METOPROLOL

### Descripción.

TÁBLETAS: Cada tabletta contiene: Tartrato de metoprolol 100 mg

Envase con 20 tabletas.

### Indicaciones.

Hipertensión arterial leve o moderada.

Profilaxis en enfermedad isquémica miocárdica.

### Vía de administración y Dosis.

Oral.

Adultos.

100 a 400 mg cada 8 ó 12 horas

Profilaxis: 100 mg cada 12 horas.

## NIFEDIPINO

### Descripción

CÁPSULA DE GELATINA BLANCA: Cada Cápsula Contiene, Nifedipino 10 mg  
Envase con 20 Cápsulas.

COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA: Cada Comprimido Contiene:  
Nifedipino 30 mg  
Envase con 30 Comprimidos.

### Indicaciones

Angina de pecho; Hipertensión arterial esencial.

### Vía de administración y Dosis

Oral → Nifedipino 10 mg

Adultos:

30 a 90 mg / día fraccionada en tres tomas. Aumentar la dosis en períodos de 7 a 14 días hasta alcanzar el efecto deseado.

Dosis máxima 120 mg / día

Oral → Nifedipino 30 mg

Adultos:

30 mg cada 24 horas, dosis máxima 60 mg / día.

## PENTOXIFILONA

### Descripción

TABLETA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA.

Cada tablet o gragea contiene Pentoxifiolina 400 mg  
Envase con 30 tabletas o grageas.

### Indicaciones

oclusión intermitente; Insuficiencia Vascular Periférica;  
Insuficiencia Cerebrovascular.

### Vía de Administración y Dosis: Oral: Adultos

400 mg cada 8 a 12 horas

## Dermatología. Infecciosas y Parasitarias.

### BENCILÓ

Descripción.

#### EMULSIÓN DERMICA:

Cada ml contiene: Benzoato de bencilo 300 mg.  
Envase con 120 ml.

#### Indicaciones

Escarabajos; Pediculosis.

Vía de administración y dosis.

Putánea

Adultos y niños.

Aplicación durante tres noches consecutivas; baño a la mañana siguiente con cambio de ropa. Repetir acuerdo del médico.

### METENAMINA

Descripción.

#### TABLETA:

Cada tableta contiene: Hipurato de metenamina 500 mg  
Envase con 30 tabletas.

#### Indicaciones

Infección de vías urinarias bajas no complicada.

Acidificador urinario.

Vía de administración y dosis.

Oral.

Adultos.

1g cada 6 u 8 horas.

Niños:

Menores de 5 años: 50 mg / kg de Peso Corporal / día dividir dosis  
Cada 6 horas.

Norma De 6 a 12 años: 500 mg Cada 6 horas

## ERITROHICINA.

Descripción.

CÁPSULA O TABLETA: Cada cápsula o tableta contiene:  
Esterato de eritromicina equivalente a 500 mg de  
eritromicina.

Envase con 20 cápsulas o tabletas.

Suspensión ORAL.

Cada 5 ml contienen:

Esterato o etiloxecinato o estolato de eritromicina equiva-  
lente a 200 mg de eritromicina.

Envase con polvo para 100 ml y desifidador.

Indicaciones.

Infecciones por bacterias gram positivas y gram negativas  
y/o ceptiles.

Vía de administración y dosis.

Oral.

Adultos:

De 250 a 1000 mg cada 6 horas

Niños:

30 a 50 mg/kg de peso corporal/día en dosis divididas  
Cada 6 horas.

## DOXICICLINA

Descripción.

CÁPSULA o TABLETA: Dada Cápsula Dentífrica.  
Hidato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina.  
Envase con lo cápsulas o tabletas.

Indicaciones

Dólera.

Infecciones por bacterias gram positivas y gram negativas sensibles.

Vía de administración y dosis.

Oral.

Dólera: 300 mg en una sola dosis

Adultos:

Otras infecciones: el primer día 100 mg cada 12 horas +  
Continuar con 1000 mg / día, Dosis 12 ó 24 horas

Niños mayores de 10 años.

4 mg / kg de peso corporal / día, administrar Dosis 12 horas  
el primer día. Después 2.2 mg / kg de peso corporal / día,  
dosis dada la del 12 horas.

## CLINDAHICINA.

Descripción.

CÁPSULA

Cada Cápsula contiene: Clorhidrato de Clindamicina equivalente a 300 mg de Clindamicina.

Envío con 16 Cápsulas.

Indicaciones:

Infecciones por bacterias anaeróbicas y bacterias gram positivas sensibles.

Vía de administración y Dosis

Orol

Adultos:

300 mg cada 6 horas.

## CLOROQUINA

Descripción.

TABLETA.

Cada Tableta contiene: Fosfato de Cloroquina.

Indicaciones:

Paludismo.

Vía de administración y Dosis

Orol.

Adultos

Inicial: 600 mg.

Bibliografía.

Catálogo - Med - 2018 - 3ra actualización - 24.07.2019 - MGR.