

**NOMBRE DEL ALUMNO: Yoana Itzel Gutiérrez
Álvarez**

**NOMBRE DEL PROFESOR: Cindy de los Santos
LICENCIATURA: Enfermería**

MATERIA: Patología del adulto

**CUATRIMESTRE Y MODALIDAD: 6° cuatrimestre
escolarizado**

**NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO: Mapa
conceptual coleditiasis**

Frontera Comalapa, Chiapas a 14 de Junio del 2021.

COLELITIASIS

Factores de riesgo

- Edad.
- Sexo femenino.
- Obesidad.
- Pérdida de peso rápida

Síntomas

- Dolor intenso en la parte superior derecha
- Dolor con la palpación del abdomen
- Náuseas
- Vómito
- fiebre

es la presencia de uno o varios cálculos (litis vesicular) en la vesícula biliar. En los países desarrollados, alrededor del 10% de los adultos y el 20% de los individuos > 65 años tienen cálculos biliares.

Tratamiento quirúrgico

a colecistectomía es el tratamiento de elección para la CA. Ello es así por diversas razones, pero fundamentalmente por el hecho de que aquellos casos que finalmente se resuelven con tratamiento médico-conservador

Colecistitis aguda

es una entidad clínica caracterizada por la inflamación de la pared vesicular. Su mortalidad global está en torno al 10%, siendo mayor en las formas acalculosas

Colelitiasis sintomática con complicaciones

Las complicaciones de la colelitiasis incluyen: colecistitis aguda, coledocolitiasis que puede producir colangitis o pancreatitis aguda biliar, fístulas biliares, síndrome de Mirizzi, vesícula en porcelana y la neoplasia vesícula.

COLECISTITIS

Colecistitis aguda alitiásica

Ocurren en ausencia de cálculos biliares. En la mayoría de las ocasiones sucede en pacientes en estado crítico, o bien asociada a diabetes mellitus

La tasa de mortalidad

Está en torno al 30 %, debido, en gran medida, a su rápida evolución a gangrena y perforación. Dada la inespecificidad del cuadro clínico

inflamación de la vesícula biliar, un pequeño órgano digestivo ubicado detrás del hígado

Factores de riesgo

- Ser mujer
- Embarazo
- Edad avanzada

Síntomas

- Náuseas
- Vómitos
- Mareos
- Dolor intenso

Colecistitis enfisematosa

Es una entidad poco frecuente, con una mortalidad en torno al 15%. Es más prevalente en el sexo masculino y en pacientes con diabetes mellitus

Coledocolitiasis (CDL)
Se define como la presencia de cálculos en los conductos biliares