

**Nombre del alumno:**

Erika Yatziri Castillo Figueroa

**Nombre del profesor:**

Cindy de los santos candelaria

**Licenciatura:**

Enfermería 6to Cuatrimestre

**Materia:**

Patología del adulto

**Nombre del trabajo:**

CUADRO COMPARATIVO del tema:

“ARTRITIS Y ARTROSIS”

	<b>ARTRITIS</b>	<b>ARTROSIS</b>
<b>DEFINICION</b>	<p>La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar más que solo las articulaciones. En algunas personas, el trastorno puede dañar distintos sistemas corporales, incluida la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos.</p> <p>La artritis reumatoide es un trastorno autoinmunitario que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del cuerpo.</p>	<p>La artrosis es una enfermedad de las articulaciones sinoviales que se caracteriza por la desintegración progresiva del cartílago y la aparición simultánea de cambios óseos regenerativos. La artrosis es la segunda causa de incapacidad permanente, después de las enfermedades cardiovasculares.</p>
<b>FACTORES DE RIESGO</b>	<p><b>Antecedentes familiares.</b> Algunos tipos de artritis son hereditarios, por lo que es probable que contraigas artritis si tus padres o hermanos tienen este trastorno.</p> <p><b>La edad.</b> El riesgo de muchos tipos de artritis, entre ellos la artrosis, la artritis reumatoide y la gota, aumenta con la edad.</p> <p><b>El sexo.</b> Las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar artritis reumatoide, mientras que la mayoría de las personas que tienen gota, otro tipo de artritis, son hombres.</p> <p><b>Lesión articular previa.</b> Las personas que se han lesionado una articulación, tal vez mientras hacían deporte, con el tiempo tienen más probabilidades de contraer artritis en esa articulación.</p> <p><b>Obesidad.</b> El peso extra fuerza las articulaciones, en especial las rodillas, caderas y columna. Las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar artritis.</p>	<p><b>Edad avanzada.</b> El riesgo de tener artrosis aumenta con la edad.</p> <p><b>Sexo.</b> Las mujeres son más propensas a padecer artrosis, aunque no está claro por qué.</p> <p><b>Obesidad.</b> Tener sobrepeso contribuye a la artrosis de varias maneras, y mientras más peso tengas, mayor será tu riesgo.</p> <p><b>Lesiones articulares.</b> Las lesiones, como las que ocurren al practicar deportes o por un accidente, pueden aumentar el riesgo de artrosis.</p>
<b>CUADRO CLINICO</b>	<p>Inflamación articular. Disminución de la capacidad para mover la articulación. Enrojecimiento y calor de la piel alrededor de una articulación. Rigidez articular, especialmente en la mañana.</p> <p>La artritis reumatoidea puede provocar dolor, hinchazón y deformidad. A medida que los tejidos que recubren las articulaciones (membrana sinovial) se inflaman y engrosan, se acumula líquido y las articulaciones se degradan y deterioran.</p>	<p>Las manifestaciones clínicas cardinales de la artrosis son el dolor articular, la limitación de los movimientos, los crujidos y, ocasionalmente, grados variables de tumefacción o incluso derrame sinovial. Otros signos y síntomas son la deformidad y mala alineación articular, la inestabilidad y la rigidez.</p>

<p><b>CAMBIOS OSEOS</b></p>	<p><b>Osteofitos.</b> Estos pedazos adicionales de hueso se sienten como bultos duros y pueden formarse alrededor de la articulación afectada.</p> <p><b>Hinchazón.</b> Esto puede producirse por la inflamación de los tejidos blandos alrededor de la articulación.</p>	<p>A menudo se habla de la artrosis como una enfermedad de desgaste. Pero además de la descomposición del cartílago, la osteoartritis afecta a toda la articulación. Provoca cambios en el hueso y el deterioro de los tejidos conectivos que mantienen unida la articulación y que unen el músculo al hueso. También provoca la inflamación del revestimiento de la articulación.</p>
<p><b>DIAGNOSTICO</b></p>	<p>Análisis de laboratorio</p> <p>El análisis de diferentes tipos de líquidos corporales puede ayudar a identificar el tipo de artritis que tengas. Los líquidos comúnmente analizados comprenden la sangre, la orina y el líquido sinovial.</p> <p>Diagnóstico por imágenes</p> <p>Radiografías. Las radiografías, que usan niveles bajos de radiación para visualizar el hueso, pueden mostrar si hay pérdida del cartílago, daño en los huesos y osteofitos.</p> <p>Tomografía computarizada (TC). Los aparatos de tomografía computarizada toman radiografías desde muchos ángulos diferentes y combinan la información para crear vistas transversales de las estructuras internas.</p> <p>Ecografía. Esta tecnología utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para obtener imágenes de los tejidos blandos, cartílagos y las estructuras que contienen líquido cerca de las articulaciones (bursas). La ecografía también se utiliza para guiar la colocación de agujas para las aspiraciones e inyecciones articulares.</p>	<p>Los análisis de sangre y orina no resultan alterados por esta enfermedad. A veces, se puede extraer líquido de las articulaciones artrósicas y analizarlo. Esto resulta útil para aliviar el dolor y eliminar la posibilidad de otras enfermedades en la articulación. Las radiografías simples de las articulaciones ayudan a confirmar el diagnóstico, informan de la intensidad del daño y permiten descartar otras lesiones. Las radiografías simples del esqueleto resultan especialmente útiles en personas menores de los 60 años de edad, donde existe una buena relación entre los síntomas y las anomalías radiológicas</p>