

Patología digestivos

* Problemas esofágicos: Enfermedad por reflujo digestivo
esofágico Cáncer de esófago

* Enfermedad por reflujo digestivo es una condición en la que los contenidos del estómago retroceden hacia la sección inferior del esófago esto puede irritar el esófago y con el tiempo hacer que se desarrolle el esófago es una afección en la cual todos o algunos contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia la o el esófago (Luz de deglución) los alimentos van desde la boca hacia el estómago a través del esófago la acidez puede irritar el tubo de deglución y causar acidez gástrica y otros síntomas las causas

Algunos consumimos alimentos que pasan desde la garganta hasta el estómago a través del esófago un anillo de fibras musculares en la parte inferior del esófago impide que el alimento deglutido vuelva a subir estas fibras musculares se denominan esfínter esofágico inferior cuando este anillo de fibras musculares no se cierra bien los contenidos del estómago pueden devolverse hacia el esófago, esto se denomina reflujo o reflujo gástrico esofágico el reflujo puede causar síntomas, los ácidos gástricos fuertes también pueden dañar el revestimiento del esófago

(Cáncer de esófago:)

el cáncer de esófago ocurre cuando se desarrollan células cancerosas en el esófago los dos tipos más comunes son el (carcinoma) de células escamosas y el (adenocarcinoma). el cáncer de esófago podría no presentar síntomas en sus etapas tempranas y se lo encuentran más frecuentemente en hombres de más de 50 años de edad

para detectar esta enfermedad se podría realizar un examen físico una radiografía del pecho, una tac del pecho una radiografía del tracto gastro intestinal superior una esofagoscopia o una (pet / tc) para ayudar a determinar si una persona tiene cáncer y se han diseminado podría ser necesario hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico de cáncer las opciones de tratamiento dependen de la extensión de la enfermedad e incluyen cirugía radioterapia y quimioterapia o una combinación de ambas

las primeras etapas son

x dificultad o dolor al tragar

x pérdida de peso

x dolor de pecho

x tos y regurgitación

x fatiga

Úlcera gástrica

También conocida como úlcera péptica o úlcera del estómago una úlcera gástrica se trata de una herida que se forma en el tejido mucoso que reviste el estómago o duodeno la primera parte del intestino delgado. Esta enfermedad del estómago de pronóstico bastante leve que con tratamiento y con una serie de cambios en los hábitos de consumo dieta equilibrada dejar hábitos de que afectan la enfermedad los síntomas más comunes de este problema el llamado ardor de estómago que puede aparecer entre comidas o durante la noche o pueda extenderse durante varias horas.

* La úlcera gástrica tiene varias funciones de cada persona ya que en ocasiones esto puede ser sintomático especialmente si hablamos de úlceras pequeñas el llamado ardor de estómago puede considerarse el síntoma más común de la úlcera péptica y se afecta por horas desde tan solo unos minutos o varias horas siendo intermitente durante varios días o semanas.

Cáncer de estómago

* El cáncer de estómago es el crecimiento anormal de las células que comienzan en el estómago. El estómago es un saco muscular ubicada en la parte media superior del abdomen justo debajo de los costillos el estómago recibe y retiene el alimento que consumes y luego ayuda a descomponer y digerirlos también el cáncer de estómago es conocido como cáncer gástrico puede atacar cualquier parte del estómago el cáncer de estómago se forma en la parte principal del estómago pero también el cáncer

esto puede atacar en la zona de donde el tubo largo por el que baja el alimento que ingerimos se une al estómago esta zona se denomina (unión gastroesofágica) el lugar del estómago donde se presenta el cáncer es uno de los factores que debe tener en cuenta el médico para la hora de determinar cuáles son posibles tratamientos por lo general el tratamiento es quirúrgico para sacar el tumor se puede recomendar otros tratamientos antes o después de la cirugía

Cáncer de Colon

el Cáncer de Colon es la afección cancerosa más común del tubo digestivo en mujeres ocupa el segundo lugar solo después del Carcinoma de mama el Cáncer rectal es ligeramente más comunes en varones en tanto que en mujeres hay una predominancia ligera de Cáncer de Colon.

La probabilidad de desarrollar Cáncer Colorrectal durante un periodo de vida de 70 años casi todos los casos de esta afección se diagnostica en mayores de 50 años y la frecuencia de la enfermedad aumenta de manera progresiva después de esta edad.

* Ostomía

es un procedimiento quirúrgico en la que se realiza una apertura para un órgano bucal. Se presentan varios casos la primera a nivel sistema digestivo en la pared abdominal para dar salida al contenido intestinal (b) directamente en el estómago como vía alterna al estómago y para el alimentario (c), también es una intervención quirúrgica en la que se practica un oficio en el abdomen para sacar fuera el tubo digestivo o urinario.

Problemas abdominales

* Enfermedad diverticular

La enfermedad diverticular es un trastorno que se produce cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que empujan hacia la fuera a través de los puntos débiles de la pared de su colon. En la diverticulitis uno o varios bolsos en la pared de su colon se inflaman.

* Los síntomas o causas que provocan esta enfermedad, en la mayoría de las personas con diverticulosis no presentan síntomas. Los síntomas pueden incluir estreñimiento, diarrea, dolor abdominal e hinchazón con frecuencia. La diverticulitis causa dolor abdominal que suele ser intenso. Los expertos no están seguros sobre que causa este trastorno.

Fistula anal y anales

La fistula anal se diagnostican con la examinacion por partes del medico especialista a veces sin embargo la fistula puede no ser perceptible a simple vista y requiriendo otras pruebas para detectarla como la anuscopia la ecografia o la resonancia magnetica por otro lado si se sospecha la presencia de otras enfermedades como la enfermedad del (Crohn) el tratamiento es la cirugía es la única opción de eliminar la fistula anal por otro lado para prevenir se debe tener en cuenta la higiene de la zona, y la dieta y el sedentarismo. La fistula anal es consecuencia del bloqueo de la salida de alguna de las glándulas anales de modo que primero se forma un absceso que acaba por romper la piel de la zona perianal.

estableciendo una conexión anormal con la superficie interna del canal anal y a través de la cual se puede llegar a producir la salida de heces no causa dolor salvo en casos en que el absceso que le origina es recurrente pero la irritación epitelial a causa del pus que quedan la detección del absceso previene a la aparición de la fistula y se debería poder evitar al menos la mitad de los casos.