



Nombre de la alumna:

Litzi Liliana Roblero Morales

Nombre del profesor:

Alfonso Velázquez Pérez

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual “Meningitis”

Materia:

Enfermería del Adulto

Grado:

6° cuatrimestre semi-sabado

Grupo: “A”

MENINGITIS

La meningitis es

Un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por microorganismos que afectan las leptomeninges.

Un 80% ocurre en

La infancia, especialmente en niños menores de 10 años.

Etiología

La sospecha etiológica es clave para el inicio precoz de la antibioterapia empírica. Para ello debemos considerar la edad del niño, enfermedades de base que pueda padecer y su estado inmunitario.

Patogenia

La meningitis bacteriana va precedida de la colonización de la nasofaringe por las bacterias, desde donde pasan a través de la sangre o por soluciones de continuidad al sistema nervioso central.

En ese momento se desencadena una respuesta inflamatoria mediada por citoquinas, que aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con lesión del endotelio capilar y necrosis tisular, y da lugar a edema cerebral, lesión de las estructuras parenquimatosas y vasculares cerebrales.

Etiología de la meningitis bacteriana en la infancia según la edad:

<1 mes: S.agalactiae. E.coli. L.monocytogenes
1-3 meses: S.agalactiae. S.pneumoniae. N.meningitidis
>3 meses: N.meningitidis. S.pneumoniae


Cuadro clínico

a) Recién nacido: indistinguible de sepsis: fiebre o hipotermia, irritabilidad o letargia, rechazo de tomas, vómitos o polipnea.

b) Lactante: cursan con fiebre o febrícula, vómitos, rechazo de tomas, decaimiento, irritabilidad, quejido, alteraciones de la conciencia, convulsiones.

c) Mayores de 1 año: forma clínica clásica: fiebre elevada que cede mal con antitérmicos, cefalea, vómitos, convulsiones, rigidez de nuca y signos de irritación meníngea.

Diagnostico



Las complicaciones las podemos citar en cuatro etapas o fases que son:

1. **Fase inmediata** (primeras 72 horas).
2. **Fase mediata** (después de 72 horas a siete días).
3. **Fase intermedia** (entre 7 - 14 días).
4. **Fase tardía** (o secuelas postinfección).

Cuidados de enfermería:

