NOMBRE DEL ALUMNO: yosmar Emanuel Figueroa Rodríguez

NOMBRE DEL PROFESOR: Alfonso Velásquez

LICENCIATURA: enfermería

MATERIA: enfermería gerontogeriatrica

CUATRIMESTRE Y MODALIDAD: 6to, semi-escolarizado

NOMBRE Y TEMA DEL TRABAJO:

Mapa conceptual, incontinencia urinaria.

Frontera Comalapa, Chiapas a 13 de junio de 2021

Incontinencia urinaria

¿Qué es?

Se define como la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra objetivamente demostrable y de tal magnitud que constituya un problema higiénico y social.

Pruebas diagnosticas

Medición de orina residual.

Estudio urodinámico.

Ecografía del suelo pélvico.

Cistoscopia.

Ecografía reno-vesical.

También

La evaluación de un paciente con incontinencia de orina debe ir no sólo a la demostración y cuantificación de la fuga, sino a la búsqueda del motivo de la misma, ya que un diagnóstico correcto nos llevará a poder ofrecer el tratamiento adecuado a cada tipo de incontinencia según su causa.

Tipos de incontinencia urinaria según el tiempo de evolución:

Son

Incontinencia transitoria o aguda (menos de 4 semanas de evolución): Como causas posibles encontramos la infección urinaria, estados de confusión mental, fármacos, vaginitis atrófica y limitación dela movilidad

Incontinencia establecida, crónica o persistente: Las principales causas son la hiperactividad del detrusor, la hipoactividad del detrusor, obstrucción infravesical y la incompetencia esfinteriana.

Tratamiento

Son

Tratamiento farmacológico

Rehabilitación del suelo pélvico

Infiltración del detrusor con toxina botulínica

Tipo, Síntomas y causas

Son

Incontinencia por urgencia o imperiosidad.

Deseo urgente de orinar seguido por una pérdida incontrolable de orina.

-Infección del tracto urinario.
-Hiperactividad de la vejiga.
-Obstrucción del flujo de la orina.
-Cálculos y tumores en la vejiga.
-Fármacos

Incontinencia por esfuerzo

Fuga de orina provocada por el aumento de la presión abdominal que se produce al toser, reír, estornudar o levantar un objeto pesado.

Debilidad del esfínter urinario (músculo que controla el flujo de orina en la vejiga) y/o de la musculatura del suelo pélvico.

Incontinencia por rebosamiento.

Retención de orina en la vejiga que se vuelve demasiado grande para que el esfínter urinario la contenga, de modo que la orina se derrama intermitentemente, de forma involuntaria, por hiperpresión.

Obstrucción del flujo de la orina.
Músculo de la vejiga debilitada.
Mal funcionamiento nervioso.
Fármacos.

Incontinencia mixta.

Tiene lugar en situaciones de esfuerzo y va asociada a la urgencia miccional

Se experimentan los síntomas de la incontinencia por esfuerzo y los síntomas de la incontinencia imperiosa.

Incontinencia neurógena.

Incontinencia como consecuencia de una enfermedad neurológica.

Alzheimer.
Parkinson.
Esclerosis múltiple.
Lesión medular