

Universidad Del Sureste
(UDS)

Trabajo 2 – RCP en Adultos

Prácticas Profesionales

Catedrática: Lic. Elvi Guadalupe Pilicastro Flores

Alumno: Miguel Ángel López Bolom

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, junio de 2021



RCP en Adultos...

- * Confirmar la seguridad de la escena
- * Verificar si la víctima no responde, pedir ayuda en voz muy alta a las personas que estén cerca, llamar a emergencias (si corresponde), obtener un DEA y equipo para emergencias
- * Comprobar si la víctima no respira o solo jadea/boquea y al mismo tiempo comprobar el pulso. Si respira normal y tiene pulso, controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencias. Si hay pulso pero no respira bien se debe proporcionar ventilación de rescate: 1 ventilación cada 5-6 seg, o unas 10-12 ventilaciones por minutos; Llamar a emergencias si aún no se ha hecho, continuar la ventilación y comprobar el pulso cada 2 minutos, si no hay pulso iniciar RCP; si se sospecha de la presencia de sobredosis de opiáceos administrar naloxona si está disponible siguiendo el protocolo.
- * Si no respira y no tiene pulso se inicia RCP, ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, utilizar DEA tan pronto como esté disponible
- * Comprobar el ritmo desfibrilable del DEA. Si es desfibrilable administrar una descarga, reanudar la RCP de inmediato durante aproximadamente 2 minutos (hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo), y continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse.
Si el ritmo del DEA no es desfibrilable, reanudar RCP de inmediato durante aproximadamente 2 minutos (hasta que lo indique el DEA para comprobar el ritmo desfibrilable) y continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse