ANTIINFLAMATORIOS

ESTEROIDALES (CORTICOSTEROIDES)

FARMACOS EMPLEADOS COMO INHIBIDORES A REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD

SE CLASIFICAN POR POTENCIA ANTIINFLAMATORIA

°HIDROCORTISON
°PREDNIASONA
°PREDNISOLONA
°TRIAMCINOLONA
°DEXAMETASONA
°BETAMETASONA

SON CONOCIDOS POR PROVOCAR ULCERAS GRASTRICAS Y HEMORRAGIAS EN LOS PERROS A CAUSA DEL BLOQUEO DE SINTESIS DE **PGs** A NIVEL DE FOSFOLIPASA A.

NO ESTEROIDALES (AINES)

FARMACOS USADOS PARA TRATAR

°INFLAMACION
°DOLOR
°FIEBRE
°DISMINUCION DE LA CUAGULACION

A TRAVÉS DE LA INHIBICIÓN DE LAS PGS, LOS AINES REDUCEN LA SECRECIÓN DE MOCO Y DE BICARBONATO, AUMENTANDO LA SECRECIÓN DE ÁCIDO GÁSTRICO Y REDUCIENDO EL FLUJO SANGUÍNEO DE LA MUCOSA.

SE CLASIFICAN
°SALICITALATOS
°FENOMATOS
°OXICAMAS
°COXIBES
°PARAAMINOFENOL
°PIRAZOLONAS
°INDOLACETICOS

TANTO LOS **CORTICOSTEROIDES** COMO LOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (**AINES**) SON CONOCIDOS POR SUS EFECTOS ADVERSOS EN LOS PERROS Y GATOS.

SIN EMBARGO, LAS COMBINACIONES DE CORTICOSTEROIDES Y **AINES** PUEDEN TENER BENEFICIOS TERAPÉUTICOS