



Nombre de alumno: SANDRA LUZ DOMINGUEZ
JIMENEZ

Nombre del profesor: RUBI PIOQUINTO BASILIO

Nombre del trabajo: MAPA CONCEPTUAL

Materia: PRACTICAS PROFESIONALES

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 9° CUATRIMESTRE

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 21 de mayo de 2021.

ESTADO GRAVE O CRÍTICO, DE COMA Y SHOCK

ESTADO CRÍTICO

Referimos o dar cuenta de aquellas situaciones cruciales y excepcionales de un hecho y que se caracteriza porque el peligro esta presente, amenaza y hasta puede resultar fatal, de vida o muerte para quien esta amenazado por el, si no logra luchar y enfrentarse con un resultado positivo

Es de los cinco estados que contempla la medicina el mas grave

Se denomina aquella sala de una clínica u hospital en la cual los pacientes alojados allí reciben soportes vitales y orgánicos, ademas se hayan conectados a diversas maquinas que permiten monitorear su estado de salud constantemente

Paciente que se haya en este estado se encontrara tratado en el área de terapia o de cuidados intensivos

Aquellos pacientes que han sufrido un grave accidente o bien aquellos que han sido sometidos a cirugía mayor sean alojados en la mencionada área

ESTADO DE COMA

Es un estado de pérdida del conocimiento prolongada

SINTOMAS

Ojos cerrados
Relejos del entrococ encefálicodebilitados, como pupilas que no respondan a la luz
Las extremidades no responden, salvo los movimientos reflejos
Respiración irregular

CAUSAS

Lesiones cerebrales traumáticas
Accidente cerebrovascular
Tumores
Diabetes
Falta de oxígeno
Infecciones, convulsiones

ESTADO DE SHOCK

Es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazon y/o de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de órganos vitales

Provoca:
Hipoxia tisular
Fallo metabólico celular
Bajo flujo sanguíneo
Distribución irregular

Incluye un conjunto se síntomas, signos y alteraciones analíticas y hemodinámicas que precisan una rapida identificación y tratamiento agresivo para reducir su elevada mortalidad

TIPOS DE SHOCK

Shock anafiláctico: Reacción sistémica de hipersensibilidad de caracter grave y a veces mortal, consecuencia de la exposición a una sustancia sensibilizante como un farmaco etc

Shock hipovolémico: Es una pérdida rapida y masiva de la volemia que acompaña a gran variedad de trastornos médicos y quirúrgicos como traumatismos, hemorragias digestivas

Shock cardiogénico: Se relaciona con un bajo gasto cardiaco asociado generalmente al infarto agudo al miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva o arritmias graves

Shock séptico: Hipotensión arterial debida a la sepsis que persiste y no responde a la expansión del volumen intravascular con líquidos, acompañada de alteraciones de la perfusión, o requiere de farmacos vaso activos para mantener la presión arterial