



Nombre del alumno:

Olivan Genaro morales Velázquez

Nombre del profesor:

Iubdi Isabel Ortiz

Materia:

Enfermería gerontogeriatría

Grupo, semestre, y modalidad:

“B” 6to semestre puericultura semiescolarizado

Frontera Comalapa Chiapas

10 junio del 2021

CONTINGENCIA URINARIA

Es la capacidad para controlar la micción

La incontinencia urinaria puede variarse desde una fuga hasta una incapacidad

La incontinencia no es un resultado inevitable de la edad perones común en personas mayores

Causas

Las causas de incontinencia urinaria se pueden dividir en agudas y persistentes

Son fácilmente recordables mediante la nemotecnia esfínter.

ENDOCRINOLÓGICAS
SICOLÓGICAS FARMACOS
TRATAMIENTOS
ESTROGENICO
RESTRICCIÓN DE LA MOVILIDAD

Tipos síntomas y causas

ESFUERZO: salida involuntaria de orina con aumento de la presión intraabdominal

URGENCIA. Derrame de orina con la capacidad para retrasar la micción después de recibir la sensación de plenitud vesical

SOBREFLUGO: fuga de orina secundaria a fuerzas mecánicas sobre una vejiga sobredesidratada

FUNCIONAL: fuga de orina con la incapacidad de utilizar el inodoro

tipos

Delirio:
vaginitis estrófica:
infección.:

tratamiento

Dar tratamiento específico para el delirio

Tratamiento local con base a estrógenos con dos aplicaciones diarias

Dar tratamiento de antibióticos

PATOLOGÍA GERIÁTRICA



P
A
T
O
L
O
G
I
A

Y

G
E
R
I
A
T
R

Artritis reumatoide

Enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune, caracterizada por una inflamación persistente de las articulaciones.

Afecta a las pequeñas articulaciones de manos y pies

Produciendo destrucción progresiva, generando incapacidad funcional

síntomas

- *Articulaciones doloridas, calientes e hinchadas
- * rigidez de las articulaciones que generalmente empeora a la mañana y después de un tiempo de inactividad
- *fatiga, fiebre y pérdida de peso.

La artritis reumatoide puede afectar

- *piel *ojos *pulmones * corazón
- * glándulas salivales * riñón *tejido nervioso
- *medula ósea *vasos sanguíneos

**A
R
T
R
O
S
I
S**

Es una enfermedad articular degenerativa

Patología articular degenerativa caracterizada por un proceso de deterioro del cartílago.

Etiopatogenia

Es el condrocito responsable del metabolismo de la matriz cartílagos en que la síntesis y la destrucción deben guardar un equilibrio

Factores que afectan.

- Fase 1: actuación de los factores etiológicos.
- Fase 2: degradación de la matriz, inflamación y cambios reparativos.
- Fase 3: cambios en sinovial, cartílago y sinovial.
- Fase 4: manifestaciones clínicas (dolor), impotencia funcional y destrucción

síntomas

Inflamación, dolor, hinchazón, rigidez

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Es la pérdida progresiva permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular

Prevalencia de la enfermedad renal crónica

En nuestro país las cifras están en torno a 126 casos por millón de población.
Tasas más altas de incidencia.
Prevalencia en el grupo mayor de 65 años

Manifestaciones clínicas y signos del IRC

Aparecen de forma progresiva manteniendo una gran variabilidad de un paciente con otro

Diagnóstico y evaluación de la IRC

Antes de toda sospecho de función renal es indispensable la realización de una correcta investigación

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias para que circule por todo el cuerpo

Causas

Obesidad, diabetes, consumo elevado en sal, el alcohol, el tabaco, falta de ejercicio

síntomas

En algunos casos la presión elevada no presenta síntomas. si no se trata con el tiempo puede provocar trastornos de la salud enfermedades cardiacas y derrames cerebrales

tratamiento

Seguir una dieta saludable con menos sal, ejercitarse regularmente y tomar medicamentos