

MAPA CONCEPTUAL

APENDICITIS AGUDA

PATOLOGIA DEL ADULTO

DRA. CINDY DE LOS SANTOS

PRESENTA LA ALUMNA:

PEREZ ROBLERO YURISELA

GRUPO, CUATRIMESTRE y MODALIDAD:

**6TO CUATRIMESTRE GRUPO "B",
ENFERMERÍA DOMINGO**

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

01 DE AGOSTO DEL 2021

APENDICITIS AGUDA

CUADRO CLÍNICO:

- ✦ DOLOR ABDOMINAL AGUDO.
- ✦ DATOS DE IRRITACION PERITONEAL.
- ✦ DATOS DE RESPUESTA INFLAMATORIA.

SIGNOS:

- ✦ Anorexia.
- ✦ Dolor.
- ✦ Náuseas y vómitos.
- ✦ Fiebre.
- ✦ Estreñimiento o diarrea.

SÍNTOMAS:

- Dolor repentino comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen.
- Dolor que comienza alrededor del ombligo.
- Dolor que empeora cuando toses.

OTROS SINTOMAS COMUNES:

- ✦ HECES BLANDAS
- ✦ DIFICULTAD PARA EXPULSAR GASES
- ✦ DIFICULTAD PARA EVACUAR INTESTINOS
- ✦ INFLAMACION DEL ABDOMEN

Puede presentarse en menores de 2 años y en mayores de 60 años

El cuadro clínico de apendicitis que ha persistido por uno o dos días asociada a fiebre y que después remite junto con el dolor.

Inflamación de apéndice cecal o vermiforme, que inicia con obstrucción de la luz apendicular.

ANATOMÍA:

Apéndice es parte del ciego, formándose en la unión distal, en donde se unen las tres tenias.

CAUSAS:

- ❖ VIRUS
- ❖ BACTERIAS
- ❖ PARASITOS

FACTORES DE RIESGO:

- ♥ FIBROSIS QUISTICA
- ♥ ANTECEDENTES FAMILIARES
- ♥ SEXO MASCULINO
- ♥ MESES DE VERANO
- ♥ EDAD < 30 AÑOS (69% DE LOS CASOS), 10-14 AÑOS EN VARONES, 15-19 AÑOS EN MUJERES

PATÓGENOS AEROBIOS Y FACULTATIVOS:

- ✦ Escherichia coli
- ✦ Streptococcus ciridians
- ✦ Streptococcus Group D
- ✦ Bacteroides fragilis
- ✦ Bacteroides sparnichus

Cada patógeno se presenta en un 70 % de los pacientes con apéndice

Más de 10 especies pueden ser cultivadas en pacientes con apendicitis infectada.

COMO REALIZAR EL DIAGNÓSTICO:

ADULTO MAYOR

- ✦ Dolor en forma generalizada de larga duración.
- ✦ Presencia de leucocitos en biometría hemática.
- ✦ Solicitar formula blanca, examen general de orina, electrolitos séricos.

DURANTE EL EMBARAZO

- ♥ Se da en el segundo trimestre.
- ♥ Nausea, vómito y anorexia.
- ♥ Con el crecimiento uterino el apéndice y ciego puede desplazarse 3-4 cm.

EDAD PEDIATRICA

- Se manifiesta con dolor abdominal, nausea o vomito.
- Dolor difuso a nivel abdominal.
- Vomito después de la aparición del dolor.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:

APENDECTOMÍA:

Es utilizada para la extracción del apéndice.

Se realiza por vía laparoscópica, la recuperación del paciente será más rápida y las complicaciones que puedan padecer sean menores.

OTROS TIPOS DE INCISION:

- Incisión transversal
- Incisión oblicua
- Incisión infraumbilical
- Incisión paramediana derecha

COMPLICACIONES:

- PERFORACION
- PERITONITIS
- FLEMON APENDICULAR
- OBSTRUCCION INTESTINAL
- PILETROMBOFLEBITIS SUPURATIVA
- INFECCION DE LA HERIDA