



**Alumna:**

**Yaquelin Monserrat López Pérez**

**Profesor:**

**CINDY DE LOS SANTOS**

**Licenciatura:**

**Enfermería.**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Materia:**

**PATOLOGIA DEL ADULTO**

**Grado:**

**6° cuatrimestre**

**Grupo:**

**“B”**

**Frontera Comalapa, Chiapas a 17 de Julio de 2021**

# APENDICITIS AGUDA

## SINTOMAS

El dolor en el abdomen es el síntoma más común.

Este dolor:

Puede comenzar en la zona alrededor de su ombligo y correrse hacia la esquina inferior derecha de su abdomen.

También puede comenzar en la esquina inferior derecha de su abdomen. Con frecuencia, empeora a medida que pasa el tiempo.

Puede sentirse peor cuando usted se mueve, respira con profundidad, toca esa zona y tose o estornuda. Si su apéndice estalla, puede que lo sienta en todo su abdomen.

Otros síntomas comunes son, por ejemplo:

- Malestar estomacal y vómito
- Falta de apetito
- Fiebre y escalofríos
- Dificultades para evacuar los intestinos (estreñimiento)
- Heces blandas (diarrea)
- Dificultades para expulsar gases
- Inflamación del abdomen

se presenta en el segundo y tercer decenios de la vida

Afecta por igual a ambos sexos, salvo entre la pubertad y los 25 años

La perforación es más frecuente en la lactancia y en los ancianos, períodos durante los cuales la mortalidad es mayor

## DIAGNOSTICO

Solicite hacerse las siguientes pruebas y análisis:

**Análisis de orina.** Para ver si tiene alguna infección de las vías urinarias.

**Análisis de sangre.** Para ver si presenta signos de infección, como tener un recuento alto de glóbulos blancos.

También es posible que le hagan pruebas de diagnóstico por imágenes, por ejemplo:

**Tomografía computarizada (TC).** Muestra imágenes detalladas de cualquier parte del cuerpo, tales como los huesos, los músculos, la grasa y los órganos.

**Ecografía abdominal.** Permite ver los órganos internos mientras están en funcionamiento. Revisa cómo fluye la sangre a través de diferentes vasos sanguíneos.

## CÓMO SE TRATA LA APENDICITIS

El apéndice puede extirparse en un procedimiento abierto o mediante laparoscopia:

**Método abierto (cirugía tradicional).** Le administrarán anestesia. Le harán un corte (incisión) en la esquina inferior derecha de su abdomen.

**Método laparoscópico.** Le administrarán anestesia. Para esta cirugía, se usan cortes (incisiones) muy pequeños y una cámara (laparoscopio) para ver dentro de su abdomen.