



Universidad Del Sureste

Carretera Villahermosa tabasco Pob.Dosmontes

Docente: Juan Carlos Riveras Arias

Alumno: José Leonardo Arias Cruz

Materia: Enfermería Medico Quirúrgica II

Grupo: G

Cuatrimestre: 6to

Producto: Mapa conceptual y cuadro sinóptico de Fisiopatología del sistema digestivo Y Pared abdominal

Fisiopatología del sistema digestivo

comunes

Apendicitis

Inflamación de la apéndice

Obstrucción de la luz apendicular favorece la proliferación bacteriana

La Secreción ininterrumpida de moco

Distensión intraluminal y aumento de presión sobre las paredes

Hepatitis

Degeneración de las células hepáticas

producen una inflamación aguda del hígado que trae como consecuencia una enfermedad clínicamente caracterizada por fiebre y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos e ictericia.

peritonitis

La inflamación del peritoneo

inflamación del peritoneo, una membrana suave que recubre las paredes abdominales internas y los órganos dentro del abdomen, la cual generalmente ocurre a causa de una infección bacteriana o micótica

Gastritis


Inflamación de la mucosa del estómago

producida por factores exógenos y endógenos que produce síntomas dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente, se observa endoscópicamente y que requiere

Úlceras

Heridas en la pared del tubo digestivo

lesiones ulcerativas del tracto gastrointestinal superior, ya sea en la porción superior del duodeno o en estómago. Se define úlcera péptica como: una lesión que penetra la capa mucosa y en ocasiones la capa muscular del estómago o duodeno, formando una cavidad con inflamación aguda y crónica a su alrededor



Fisiopatología de la pared abdominal

El dolor visceral

se origina en las vísceras abdominales, que están inervadas por fibras nerviosas autónomas y responden, principalmente, a sensaciones de distensión y contracción muscular

Las vísceras están inervadas. También lo están los tejidos conjuntivos que las rodean. Por tanto, cuando hay un daño en estas estructuras, pueden ser fuente de nocicepción

El dolor somático

se origina en el peritoneo parietal, que está inervado por nervios somáticos y responde a una irritación debida a procesos infecciosos, químicos u otros procesos inflamatorios. El dolor somático es agudo y bien localizado.

se percibe localizado en la pared abdominal sobre el punto de irritación del peritoneo parietal, como en el punto de McBurney en la apendicitis

El dolor referido

se percibe lejos de su origen y se debe a la convergencia de fibras nerviosas en la médula espinal. Los ejemplos comunes de dolor referido son el escapular causado por un cólico biliar, el inguinal causado por un cólico renal y la omoalgia secundaria a sangre o infección que irrita el

se origina por convergencia de fibras aferentes viscerales y espinales correspondientes a una misma metámera, en una misma neurona, a nivel del hasta posterior

Peritonitis

es la inflamación de la cavidad peritoneal. La causa más grave es la perforación del tubo digestivo, que provoca una inflamación química inmediata seguida de una infección por microorganismos intestinales.

La peritonitis es generalmente infecciosa y puede ser mortal. Es ocasionada por una filtración o un orificio en los intestinos,

(Ansari, 2020)

Trabajos citados

Ansari, P. (Abril de 2020). *Manual MSD*. Obtenido de <https://www.msmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-gastrointestinales/abdomen-agudo-y-gastroenterolog%C3%ADa-quir%C3%BAgica/dolor-abdominal-agudo>

Plus, M. (26 de Marzo de 2020). *Media Plus* . Obtenido de <https://medlineplus.gov/spanish/digestivediseases.html>