



Itzel Pérez González

3er cuatrimestre

Lic. En enfermería

-Salud pública-

Prof. Gabriela Priego Jiménez

Estado vacunal

Nombre	Enfermedad	Edad	Sitio de aplicación	vía	Dosis	Reacción	Contraindicación
BCG	Tuberculosis	Al nacer	En el brazo derecho	Intradérmica	0.05 ml	La molestia más frecuente en el lugar donde se aplicó es la aparición de un nódulo dos a cuatro semanas; después se forma una úlcera que no requiere ningún tipo de tratamiento, sólo mantenerla limpia. Aparecerá una costra en la sexta a doceava semana después de la vacunación, que al final deja una cicatriz.	Leucemia, Linfomas, infecciones por VIH, deficiencias del sistema inmune, terapia inmunosupresora, Corticosteroides y radioterapia. Hipersensibilidad a componentes de la vacuna, fiebre alta.
Hepatitis B	Hepatitis B	Al nacer	(Niños en cara del muslo antero lateral, externo de muslo izquierdo). Pierna.	Intramuscular	1era dosis	El dolor donde se administra la inyección o la fiebre pueden ocurrir después de la vacuna contra la hepatitis B.	Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) después de una dosis anterior o ante un componente de la vacuna
		2 meses			2da dosis		
		6 meses			3era dosis		
Pentavalente a celular DEap+VIP+Hib	Difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis o infecciones por H. influenza B.	2 meses	Brazo o pierna	Intramuscular	1era dosis	Enrojecimiento, hinchazón o dolor en el lugar de la inyección	Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) después de una dosis anterior o a un componente de la vacuna
		4 meses			2da dosis		
		6 mes			3er dosis		
		18 mes			4ta dosis		
DPT	Difteria, tos ferina y tétanos.	4 años	brazo	Intramuscular	0.5ml	El enrojecimiento, malestar, inflamación y sensibilidad donde se puso la vacuna es común después de DTP. Fiebre, irritabilidad, cansancio, poco apetito y vómitos suceden algunas veces de 1 a 3 días después de la vacuna de DTP.	Enfermedad aguda moderada o grave con o sin fiebre • Síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas siguientes a una dosis anterior de una vacuna con toxoide tetánico
Rotavirus	Diarrea por rotavirus	2 meses	Boca	oral	2ml	Disminución del apetito e irritabilidad, fiebre, escurrimiento de nariz, dolor abdominal, diarrea o vómito leves.	Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) después de una dosis anterior o a un componente de la vacuna
		4 meses					
		6 meses					

Influenza	Influenza	6 meses	Muslo izquierdo	intramuscular	0.25ml	Los eventos locales que puedes presentar son mayor sensibilidad en el sitio de aplicación, dolor, enrojecimiento y endurecimiento del lugar donde se aplicó la vacuna (induración).	Reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) después de Una dosis anterior de cualquier vacuna antigripal o a un componente de la vacuna, incluida la proteína del huevo. • Lactantes menores de 6 meses
		7 meses			0.25ml		
		59 mes			0.5ml		
SRP	Sarampión, rubiola y parotiditis	1 años	Bazo izquierdo	Subcutánea	Primera 0.5 ml	Puede presentar 5 o 12 días después de la vacunación: malestar general, escurrimiento de nariz, dolor de cabeza, tos y/o fiebre (38.5°C); estos síntomas pueden durar de dos a tres días, son auto limitados. Entre los 5 y 12 días después de la vacunación puede aparecer un salpullido en la piel, dura dos días y se resuelve sin necesidad de manejo médico.	Puede ser usada en niños con la infección establecida o sospechada de VIH. La vacuna es contraindicada en personas que son severamente inmunocomprometidas como resultado de una enfermedad congénita, infección de VIH, leucemia avanzada o linfoma, enfermedad maligna seria o tratamiento
		6 años			Refuerzo 0.5ml		
Sabin	poliomielitis	6meses-5años	boca	Vía oral	Liquido disuelto en agua o comida	Puede presentarse dolor de cabeza, vómito y diarrea, que son auto limitados y se resuelven espontáneamente	Está contraindicada en los individuos con hipersensibilidad a la Noemicita, polimixina o a cualquier otro componente de la vacuna.
SR	Sarampión y rubiola	A partir de los 10 años.	Brazo izquierdo	Subcutánea	0.5ml	Puede presentar fiebre de 38.5 a 39°C, aparecer un salpullido a los 5 o 12 días después de la aplicación de la vacuna, inflamación de ganglios (bolitas en el cuello)	La vacuna no está indicada para mujeres embarazadas y en menores de 18 años de edad, al no haberse realizado ensayos en estos sectores de la población

TDPA	Tétanos, difteria y tos ferina	11-12 años	Brazo izquierdo	Intramuscular	0.5ml	Las reacciones que puedes presentar con mayor frecuencia son dolor e hinchazón moderada en el sitio de la aplicación. Otros eventos pueden ser fiebre, malestar, fatiga y dolor de cabeza (cefalea), por lo general son de intensidad leve a moderada y transitorios.	<ul style="list-style-type: none"> - Historial de hinchazón extensa de las extremidades después de DTP/DTPa/Tdpa/Td que no se trate de una reacción de tipo Arthur - Historia de trastorno neurológico estable - Historia de neuritis braquial - Alergia al látex no anafiláctica - Amamantamiento - Inmunosupresión
VPH	Infección por el virus del papiloma humano y cáncer cervicouterino.	12-13 años.	Brazo izquierdo	Intramuscular	0.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> Enrojecimiento Moretones Picazón Hinchazón Dolor Celulitis Dolores de cabeza 	<ul style="list-style-type: none"> - Prueba previa de Papanicolaou alterada - Infección conocida por VPH - Amamantamiento - Historia de verrugas genitales