



Nombre del alumno: Adrián Guadalupe Díaz Álvarez

Nombre del profesor: Gabriela Priego Jiménez

Nombre del trabajo: súper nota

Materia: salud pública

Grado: 3 cuatrimestre

Grupo: B

	Datos.
Nombre de la vacuna	DTap
Contra que enfermedad protege	Difteria. Tetano. Tosferia
Via	Se administra por vía intramuscular, en la zona anterolateral externa del músculo, en niños pequeños, mayores y adultos.
Dosis	Se recomienda 6 dosis, 3 primarias y 3 de refuerzos. La primaria debe comenar desde 6 semanas de edad y posteriormente a los intervalos 4 semanas
Sitio de aplicación	La aplicación de la vacuna es gratuita y se puede aplicar en centros de salud públicos o privados
Reacción de la vacuna	Dolor, enrojecimiento, hinchazon y en algunas ocasiones, temperatura y hasta doler de cabeza leve
Contra indicacion	Se recomienda que los niños y los preadolescente reciban 5 dosis y un refuerzo contra el tetano

Nombre de la vacuna	BCG
Contra que enfermedad protege	protege de formas graves de tuberculoses millar y la meninges tuberculosa
Via	Intradermica
Dosis	Dosis única al nacer 01 ml
Sitio de aplicación	Región de tode del brazo derecho (región superior del musio del toides)
Reacción a la vacuna	Al aplicarl vacuna aparece una papula 30 minutos acabo de 2 0 3 semanas
Contra indicacion	RN nacidos de 2000grm dificultad inmunitaria congénito

Nombre de la vacuna	DTP
Contra que enfermedad protege	100% los toxides diférico y létánico 80% para la fracción pertugs después de la se primaria de vacuna pentavalente
Via	Intramuscular
Dosis	05 ml refuerzo a los 4 años
Sitio de aplicación	Región del toidea o tricipital del brazo izquierdo
Reacción de la vacuna	En el sitio de aplicación puede presentarse en las 48 horas se presenta fiebre
Contra indicacion	No se je aplique a mayores de seis meses Reacción alergica grave (anatiaxia) Encefalopatial

Nombre de la vacuna	Rotavirus
Contra que enfermedad protege	protege de la enfermedad potencialmente grave diarrea vomito y dolor de estomago a causa del rotavirus
Via	Oral
Dosis	1.5milPrimera dosis 4 dosis a los 2 meses segunda meses tercera dosis a los 6 meses de edad
Sitio de aplicación	
Reacción de la vacuna	Reacción anafilactica con una dosis previa con alguna de los diluyentes de la vacuna Inmunoficiencia primaria o secundaria invaginación intestinal
Contra indicacion	Se pueden presentar irritabilidad y fiebre



Nombre de la vacuna	Neumococica
Contra que enfermedad protege	infecciones como la meningitis neumococca infección del tejido que recubre el cerebro y la medula espinal) y la neumonia
Via	Intramuscular
Dosis	(0 5ml) 1 dosis a los 2 meses 2 dosis a los 4 meses 3 dosis a los 12 meses
Sitio de aplicación	Torció medio de la cara anterolateral del músculo derecho
Reacción de la vacuna	Revestimiento, de la cara anterolateral en el sitio de del muslo derecho entemaunflamación aplicación Fiebre de 38% disminución de apetito
Contra indicacion	Si hubo una reacción anafilactica con una dosis previa con alguno de los diluyentes de la vacuna Es una precaución si existe enfermedad condo

Nombre de la vacuna	Triple viras SRP
Contra que enfermedad protege	Sarampión, paperas y rubeola
Via	Subcutánea
Dosis	(0.5ml) Primera dosis a 12 meses de edad Segunda dosis a los 6 años de edad
Sitio de aplicación	Brazo izquierdo
Reacción de la vacuna	Puede presentar dolor induración enrojecimiento en el sito de aplicación Apartir del quinto dia puede presentarse febre y síntomas notaringeos respiracion de curta duracion
Contra indicacion	Reacción anafilactica con una dosis previa o con alguna de las constituye Embarazo Inmunosupresión congênita o adquirida

Nombre de la vacuna	Vacuna contra influenza
Contra que enfermedad protege	Contra la influenza estacional ( gripe)
Via	Intramuscular
Dosis	0 25ml 35 meses 0.5 ml 36 meses a 8 años
Sitio de aplicación	Lactantes de 6 a 18 meses en la cara antero lateral del musculo vasto del musculo izquierdo a18 meses musculo deltoides Reacciones En lo más presentan son dolor. enrojecimiento infamación en el sitio de inyección. En otros casos muy pocos puede izquierdo
Reacción de la vacuna	presentan son dolor. enrojecimiento infamación en el sitio de inyección. En otros casos muy pocos puede izquierdo presentar febriculo
Contra indicacion	Esta contraindicada si hubo una reacción anafilactica con una dosis o con algunos de los diluyentes de la vacuna Son precauciones si se desarrolló SG86 semanas despues de una dosis previ existe enfermedad d grado moderais hobre