



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ALUMNA:

Valeria García Victoria

GRUPO:

3 B

CARRERA:

Lic. Enfermería

PROFESORA:

Gabriela Priego Jiménez

ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS DE EDAD

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD	VÍA	SITIO DE APLICACIÓN	REACCIONES	CONTRA INDICACIÓN
BCG	Tuberculosis	Única	Al nacer	Vía intradérmica	Brazo derecho	Fiebre. sangre en la orina. necesidad de orinar con frecuencia o dolor al orinar. malestar estomacal.	No se debe aplicar - Cuando clínicamente existe enfermedad tuberculosa. - Personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas
Hepatitis B	Hepatitis B	Primera	Al nacer	Vía intramuscular	Muslo izquierdo o brazo derecho	Puede aparecer dolor, enrojecimiento e hinchazón de la zona de inyección e intranquilidad.	Está contraindicada para las personas con historial de reacciones alérgicas a cualquiera de los componentes de las vacunas.
		Segunda	2 mese				
		Tercera	6 meses				
Pentavalente acelular DPaT + VPI+Hib	Difteria, tos ferina, Tétanos, Poliomieltis, e infecciones por Haemophilus influenzae b	Primera	2 meses	Vía intramuscular o subcutánea	Muslo derecho o brazo izquierdo	Fiebre, llanto, diarrea, vómitos, falta de sueño y de apetito, irritabilidad y malestar general, dolor de cabeza, escalofrío, dolor muscular y de articulaciones	Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, menores de 6 meses de edad, reacciones graves a dosis previas, alergia al huevo, enfermedades graves con o sin fiebre
		Segunda	4 meses				
		Tercera	6 meses				
		Refuerzo	18 meses				
DPT	Difteria, tos ferina, Tétanos	Refuerzo	4 años	Vía intramuscular	Brazo izquierdo	Fiebre, leve. Irritabilidad, cansancio, pérdida del apetito, y molestias, enrojecimiento o inflamación en el lugar del pinchazo.	Está contraindicada en la encefalopatía evolutiva, presencia de signos neurológicos con o sin convulsiones y en enfermedades agudas o crónicas
Rotavirus	Diarrea por rotavirus	Primera	2 meses	Vía Oral	Boca	Disminución del apetito e irritabilidad, fiebre, escurrimiento de nariz, dolor abdominal, diarrea o vómito leves.	Un bebé que ha tenido una reacción alérgica mortal debido a una dosis de la vacuna contra el rotavirus no debe recibir otra dosis. Los bebés con "inmunodeficiencia combinada grave" no deben recibir la vacuna contra el rotavirus
		Segunda	4 meses				
		Tercera	6 meses				
Neumocócica conjugada	Infecciones por neumococo	Primera	2 meses	Vía intramuscular	Muslo derecho	Enrojecimiento, hinchazón, dolor o sensibilidad en el área en la que se aplicó la vacuna , así como fiebre, pérdida de apetito, susceptibilidad (irritabilidad), cansancio, dolor de cabeza y escalofríos.	-Reacción alérgica grave a dosis previas de la vacuna. -Niños moderadamente o gravemente enfermos (resfriados leves si se deben vacunar)
		Segunda	4 meses				
		Refuerzo	12 meses				
Influenza	Influenza	Primera	6 meses	Vía intramuscular	Muslo o brazo izquierdo	Dolor, enrojecimiento y/o inflamación en la zona donde se inyectó la vacuna, dolor de cabeza (poca intensidad), fiebre, náuseas, dolor muscular y fatiga.	No debe administrarse a los siguientes grupos: Niños de <2 años de edad. Adultos de ≥50 años de edad. Personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna.
		Segunda	7 meses				
		Revacunación	Anual hasta los 59 meses				
		Revacunación	Anual a niños de 5 a 9 años con factores de riesgo				
SRP	Sarampión, rubeola y parotiditis	Primera	1 año	Vía intramuscular o subcutánea	Brazo izquierdo	Dolor, calor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, esto no requiere tratamiento y puede durar hasta tres días.	No se debe aplicar en casos de reacciones de hipersensibilidad marcada al huevo y a la neomicina,
		Refuerzo	6 años				
Sabin	Poliomieltis	Adicionales 1ra y 2da semanas nacionales de salud	De 6 meses a 4 años 11 meses	Vía oral	Boca	Dolor de cabeza, vómito y diarrea, que son autolimitados y se resuelven espontáneamente	Está contraindicada en personas con hipersensibilidad a la gentamicina o a cualquier otro componente de la vacuna
SR	Sarampión y rubeola	Adicionales		Vía intramuscular o subcutánea	Brazo izquierdo	Malestar general, escurrimiento de nariz, dolor de cabeza, tos y/o fiebre (38.5°C); estos síntomas pueden durar de dos a tres días, son autolimitados.	Antecedente de algún evento grave o reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna. Estar embarazada.

BIBLIOGRAFÍA

<https://www.gob.mx/salud/articulos/esquema-de-vacunacion>