



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA**

FARMACOLOGIA Y VETERINARIA I

**CATEDRATICO: FRANCISCO DAVID
VAZQUEZ MORALES**

**ALUMNA: RAQUEL VIRGINIA
RIZO ESCALANTE**

baytril max

26/07/2021

Antibiótico bactericida

INDICACIONES: Baytril Max esta indicado en bovinos para el tratamiento de la Enfermedad Respiratoria Bovina (ERB) causada por: *pasteurella multócida*, *pasteurella haemolytica*, *haemophilus sp* y *micoplasma sp*. En porcinos para el tratamiento de infecciones respiratorias producidas por *Actinobacillus pleuroneumoniae*.

DOSIS: Baytril Max se aplica por vía subcutánea a una dosis de 7.5 mg/kg de peso que en la practica corresponden a 7.5 ml por cada 100 kg de peso vivo. Según criterio del médico veterinario la dosis puede repetirse después de 72 horas de la aplicación inicial.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben ser sacrificados para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

CONTRAINDICACIONES: Uso Veterinario. Por su espectro de acción y su potencia no requiere combinarse con antibióticos

MODO DE APLICACIÓN: Solución inyectable

PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml